

Čelní strana kartičky
Velikost po složení:
127 x 78 mm

GILENYA[®] (fingolimod)

Při prvním užití přípravku

- **Pomalá nebo nepravidelná srdeční činnost** – Na začátku léčby způsobuje přípravek GILENYA[®] snížení srdeční frekvence. To může způsobit, že se Vám bude točit hlava nebo Vám klesne krevní tlak. Váš lékař Vás požádá, abyste zůstal/a v ordinaci nebo na klinice ještě 6 hodin po užití první dávky, aby bylo možno podniknout potřebné kroky, pokud by se nežádoucí účinky objevily. Stejná opatrnost je zapotřebí při znovuzahájení léčby po jejím přerušení na více jak dva týdny.

Čelní strana kartičky

Zadní strana kartičky

Pro více informací o přípravku GILENYA[®] nebo o tomto průvodci můžete kontaktovat místní zastoupení společnosti Novartis na adrese: Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724 /129, 140 00 Praha 4, tel.: 225 775 111; fax: 225 775 222, www.novartis.com.

GIL-012/07/2011



Během léčby přípravkem

- **Infekce** – Během léčby přípravkem GILENYA® můžete být citlivější k infekcím. Pokud se budete během léčby nebo až 2 měsíce po jejím skončení domnívat, že máte infekci, budete mít horečku, nebo budete cítit, že máte chřipku, kontaktujte ihned svého lékaře.
- **Zrakové příznaky** – Přípravek GILENYA® může způsobit otok očního pozadí, stav označovaný jako makulární edém (otok žluté skvrny). Informujte svého lékaře o jakýchkoliv změnách zraku během léčby a až dva měsíce po jejím skončení.
- **Jaterní funkce** – Přípravek GILENYA® může způsobovat abnormální výsledky jaterních funkčních testů. Bude zapotřebí, abyste

- podstoupil/a vyšetření krve před zahájením léčby a poté za 1, 3 a 6 měsíců léčby přípravkem GILENYA® a pravidelně i poté.
- **Těhotenství** – Během léčby přípravkem GILENYA® a dva měsíce po jejím skončení byste neměla otěhotnět, protože existuje riziko poškození plodu. Poradte se se svým lékařem o vhodných metodách antikoncepce, které byste měla během léčby a dva měsíce po jejím skončení používat. Okamžitě informujte svého lékaře, pokud během léčby přípravkem GILENYA® nebo 2 měsíců po jejím skončení otěhotníte (ať už úmyslně nebo neúmyslně).