Deník bolesti

Záznamová karta

Záznamová karta přípravku Effentora®

600/800 mikrogramů
4/28 bukálních tablet

Pravidelně užívané léky na bolest			Intenzita bolesti 1-10	
Název léku	Datum	Denní doba	Před lékem	Po léku

Škála intenzity bolesti od 0 (žádná) do 10 (nejhorší bolest)

Žádná bolest — Nejhorší bolest

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplikovaná dávka Effentora® 600/800 µg – **datum/čas/síla**	Činnost, při které se průlomová bolest objevila	Místo bolesti na těle	Opakovaná dávka ano/ne; **Pokud ano: čas** **Neužívejte opakovanou dávku 600/800 µg. Pro případ, že budete potřebovat opakovanou dávku, konzultujte předem její výši s lékařem.**

Veďte si, prosím, záznam o tom, kdy a kolik tablet přípravku Effentora® jste použil(a). Pomůže to Vám i Vašemu lékaři ověřit správnost léčby.

Pokud Vám zbývají 4 a méně tablet, obraťte se, prosím, bez prodlení na Vašeho ošetřujícího lékaře tak, aby byla i nadále zajištěna dostatečná kontrola Vaší průlomové bolesti.

Je důležité, abyste používali přípravek Effentora® k léčbě maximálně 4 příhod průlomové bolesti denně. Jednotlivé příhody průlomové bolesti by neměly být léčeny více než 2 tabletami, které užijete po 30 minutách a pouze v případě, že první tableta nevedla k dostatečné úlevě bolesti. **Neužívejte opakovanou dávku ve výši 600/800 mikrogramů, poraďte se předem o výši opakované dávky s lékařem.**