

Tuto kartičku mějte neustále u sebe a ukažte ji každému lékaři, který Vás bude léčit.

Infekce

Cimzia zvyšuje riziko vzniku infekcí. Infekce se mohou mnohem rychleji zhoršovat a mohou mít závažnější průběh. Toto zahrnuje i tuberkulózu (TBC).

Před zahájením léčby Cimzií

- Cimzií nesmíte být léčen(a), pokud trpíte závažnou infekcí.
- Měl(a) byste být vyšetřen(a) na infekci virovou hepatitidou B. Jestliže jste přenašeč/ka hepatitidy B, měl(a) byste být pečlivě sledován(a) na projevy a příznaky aktivní hepatitidy B. Léčba Cimzií musí být přerušena u pacientů s aktivní virovou hepatitidou B.

- Měl(a) byste být vyšetřen(a) na TBC. Je velmi důležité, abyste svého lékaře informoval(a), že jste prodělal(a) TBC nebo jste byl(a) v blízkém kontaktu s osobou/osobami trpícími TBC.

Prosím, uveďte datum Vašeho posledního vyšetření na TBC:

Tuberkulinový test: _____

RTG hrudníku: _____

Během léčby Cimzií

- Pokud se u Vás projeví příznaky naznačující infekci, jako je horečka, přetrvávající kašel, úbytek hmotnosti či netečnost (apatie), vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Srdeční selhání

Před zahájením léčby Cimzií

- Lékař musí u pacientů se srdečním selháním postupovat opatrně. Pokud trpíte středně závažným či závažným srdečním selháním, nesmí Vám být Cimzia podána.

Během léčby Cimzií

- Pokud se u Vás projeví příznaky, které potenciálně mohou být spojeny se srdečním selháním (např. dušnost či otoky nohou), vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Alergické reakce

Jestliže máte příznaky, které mohou být způsobeny alergickými reakcemi, jako je pocit sevření na hrudi, sípání, závrať, otok nebo vyrážka, přestaňte užívat Cimzii a kontaktujte ihned svého lékaře. Některé z těchto reakcí by se mohly vyskytnout po prvním podání Cimzie.

Očkování pacientů

- Prosím, buďte si vědom(a), že živé nebo živé oslabené vakcíny nesmějí být podávány současně s Cimzií.

Pacienti před chirurgickými zákroky

- Jestliže je Vám podávána Cimzia a máte se podrobit chirurgickému zákroku, měl(a) byste být pečlivě sledován(a) na výskyt infekce a musí být přijata příslušná opatření.

Malignity

- Použití blokátorů TNF může zvýšit riziko rakoviny. Jestliže se u Vás objeví nevysvětlitelná ztráta tělesné hmotnosti nebo únava, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Tyto příznaky však nemusí znamenat rakovinu.

Ovlivnění výsledků vyšetření

Prosím informujte svého lékaře, jestliže jste léčen(a) protisrážlivými léky a jestliže byl u Vás proveden test na srážlivost krve.

U pacientů léčených Cimzií bylo pozorováno zkreslení výsledků určitých vyšetření krevní srážlivosti (koagulační vyšetření). Cimzia může způsobit, že tyto testy chybně indikují prodloužený čas krevní srážlivosti, přestože tomu tak není. Tento jev byl pozorován u testů PTT-LA a STA-PTT A společnosti Diagnostica Stago a u testů HemosIL APTT-SP liquid a HemosIL APTT lyophilised silica společnosti Instrumentation Laboratories. Další aPTT testy mohou být též ovlivněny.

Ovlivnění vyšetření trombinového času (TT) a protrombinového času (PT) nebylo pozorováno. Není k dispozici důkaz, že by léčba Cimzií měla vliv na srážlivost krve (*in vivo* koagulace).

Každý lékař ošetřující pacienta léčeného přípravkem Cimzia by měl pro podrobnější informace vyhledat SPC přípravku Cimzia.

Termíny léčby Cimzií

První injekce: _____

Následující injekce: _____

Jméno pacienta: _____

Jméno praktického lékaře a telefon: _____

Jméno lékaře specialisty a telefon: _____

- Přečtěte si příbalovou informaci, kde získáte další informace.
- Ujistěte se, prosím, že při každé návštěvě lékaře u sebe máte seznam všech dalších léků, které užíváte.

Tuto kartičku noste u sebe ještě 5 měsíců po poslední dávce Cimzie, protože nežádoucí účinky se mohou projevit dlouho po podání poslední dávky přípravku.