



DOPORUČENÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

- Lékaři by měli přísně dodržovat kontraindikace.
- Lékaři a lékárníci by měli pacientům používajícím topické léčivé přípravky obsahující ketoprofen připomínat nutnost dodržování preventivních opatření proti fotosenzibilizaci.

Seznam opatření při použití topických léčivých přípravků obsahujících ketoprofen

- Informujte pacienta o nutnosti pečlivě si omýt ruce po každé aplikaci topického ketoprofenu.
- Informujte pacienta, že v průběhu léčby a dvou týdnů po ukončení léčby je nutno kůži chránit před slunečním zářením (při jakémkoli, i oblačném počasí) a UVA zářením.
- Informujte pacienta, že musí léčené oblasti kůže chránit volným oblečením (v průběhu léčby a dvou týdnů po ukončení léčby).
- Informujte pacienta, že topické přípravky obsahující ketoprofen nesmí používat pod neprodyšnými obvazy.
- Informujte pacienta, že když dojde k rozvoji kožní reakce po aplikaci topického ketoprofenu, včetně reakce vzniklé po současném podání s přípravky obsahujícími oktokrylen, je nutné okamžitě ukončit léčbu. Pokud je reakce závažnější, je nutno vyhledat lékařskou pomoc.

Výzva k hlášení nežádoucích účinků

Jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné po zdraví léčených osob musí být hlášeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Při podezření na fotosensitivitu po podání topických přípravků obsahujících ketoprofen prosíme o nahlášení všech, včetně nezávažných reakcí. Podrobnosti o hlášení najdete na <http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek> Adresa pro zaslání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, e-mail: farmakovigilance@sukl.cz

Tato informace může být také hlášena zástupci držitele rozhodnutí o registraci na adresu Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 – Michle, tel.: 267 199 333, fax: 267 199 336, e-mail: office@berlin-chemie.cz

Před předepsáním přípravku prostudujte platnou verzi Souhrnu údajů o přípravku.

