

Monitorovací schéma funkce jater při užívání Valdoxanu

☐ Valdoxan 25 mg

- ☐ Před zahájením léčby ALTμkat/l
ASTμkat/l
- ☐ Týden 3 ALTμkat/l
ASTμkat/l
- ☐ Týden 6 ALTμkat/l
ASTμkat/l
- ☐ Týden 12 ALTμkat/l
ASTμkat/l
- ☐ Týden 24 ALTμkat/l
ASTμkat/l

Prosím proveďte test kdykoliv, pokud je klinicky indikováno.


☐ V případě zvýšení dávky na **50 mg**, znovuzahájení monitorovacího schématu.

- ☐ Zahájení léčby ALTμkat/l
ASTμkat/l
- ☐ Týden 3 ALTμkat/l
ASTμkat/l
- ☐ Týden 6 ALTμkat/l
ASTμkat/l
- ☐ Týden 12 ALTμkat/l
ASTμkat/l
- ☐ Týden 24 ALTμkat/l
ASTμkat/l

Prosím proveďte test kdykoliv, pokud je klinicky indikováno.

Jméno pacienta: _____

Datum zahájení léčby: _____



* Jako je tmavá moč, světlé zbarvení stolice, zežloutnutí kůže/očí, bolest v pravé horní části břicha, neustupující nově vzniklá a nevysvětlitelná únava