PŘIPOMÍNKOVÁ KARTA PLÁNOVANÝCH KREVNÍCH TESTŮ

NEZAPOMEŇTE

Je důležité, abyste během léčby přípravkem Valdoxan pravidelně podstupoval(a) krevní testy.

NÁSLEDUJÍCÍ TABULKA VÁM POMŮŽE SLEDOVAT PLÁNOVANÁ DATA KREVNÍCH TESTŮ.

VALDOXAN 25 mg – DATUM PRVNÍHO UŽITÍ:	
Intervaly krevních testů ke zjištění hladiny jaterních enzymů	**Datum**
Datum prvního testu *(při zahájení léčby)*	
Datum druhého testu *(asi za 3 týdny)*	
Datum třetího testu *(asi za 6 týdnů)*	
Datum čtvrtého testu *(asi za 3 měsíce)*	
Datum pátého testu *(asi za 6 měsíců)*	

Lékař může rozhodnout, že je třeba provést další krevní testy.

ZVÝŠENÍ DÁVKY NA 50 mg – DATUM PRVNÍHO UŽITÍ:	
Intervaly krevních testů ke zjištění hladiny jaterních enzymů	**Datum**
Datum testu při zvýšení dávky na 50 mg	
Datum druhého testu *(asi za 3 týdny)*	
Datum třetího testu *(asi za 6 týdnů)*	
Datum čtvrtého testu *(asi za 3 měsíce)*	
Datum pátého testu *(asi za 6 měsíců)*	

Lékař může rozhodnout, že je třeba provést další krevní testy.

Nezapomeňte tuto kartičku přinést na každou návštěvu u svého lékaře.

Podrobnější informace naleznete v příbalové informaci obsažené v balení přípravku Valdoxan.

VALDOXAN

Doporučení k předcházení jaterních nežádoucích účinků

Valdoxan může vyvolat nežádoucí účinky včetně změn jaterních funkcí.

Tato příručka poskytuje doporučení, jak předcházet jaterním nežádoucím účinkům, a rady, co dělat, pokud se během léčby přípravkem Valdoxan tyto nežádoucí účinky vyskytnou.

Pokud potřebujete jakékoli další informace, zeptejte se svého lékaře.

Valdoxan je antidepresivum, které pomáhá léčit depresi.

Pro správný průběh zdravotní péče dodržujte doporučení svého lékaře ohledně užívání přípravku Valdoxan (dávka, délka léčby, sledování průběhu léčby zahrnující pravidelné návštěvy a krevní testy).

CO DĚLAT PŘED ZAHÁJENÍM LÉČBY PŘÍPRAVKEM VALDOXAN?

- **Informujte svého lékaře, pokud jste si vědom(a), že Vaše játra nepracují správně: v takovém případě Valdoxan neužívejte.**
- Mohou existovat i **jiné důvody, kvůli kterým pro Vás Valdoxan nemusí být vhodný**.

  Prosím, poraďte se s lékařem, jestliže:
  – jste někdy měl(a) problémy s játry,
  – trpíte obezitou nebo nadváhou,
  – máte cukrovku,
  – pijete alkohol,
  – užíváte jiné léky (některé z léků ovlivňují játra).

JAK PŘEDCHÁZET PROBLÉMŮM BĚHEM LÉČBY?

➢ **Pravidelně docházejte na krevní testy**

- **Proč?**

Lékař **před zahájením léčby** musí zkontrolovat, že Vaše játra pracují správně. Krevní testy, na které Vás lékař odeslal, mu ukážou, **jak Vaše játra pracují**, a pomohou mu rozhodnout, jestli je pro Vás Valdoxan vhodný.

Během léčby přípravkem Valdoxan může u některých pacientů dojít ke zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi. Hladiny těchto jaterních enzymů ukazují, jestli je funkce jater dostatečná nebo nedostatečná, a pro lékaře jsou nezbytné ke sledování průběhu Vaší léčby.

- **Kdy?**

	Před zahájením léčby nebo při zvýšení dávky	Asi za 3 týdny	Asi za 6 týdnů	Asi za 3 měsíce	Asi za 6 měsíců
Krevní testy	✓	✓	✓	✓	✓

Pokud Vám lékař zvýší dávku na 50 mg, znovu je zapotřebí provést krevní testy.

Nezapomeňte k lékaři přinést **PŘIPOMÍNKOVOU KARTU PLÁNOVANÝCH KREVNÍCH TESTŮ** (na další straně)

Ihned informujte svého lékaře, pokud se dozvíte, že během léčby došlo k vzestupu hladiny jaterních enzymů ve Vaší krvi.

➢ **Dávejte pozor na projevy a příznaky jaterních problémů**

Pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků, může to znamenat, že Vaše játra nepracují správně:
– zežloutnutí kůže/očí,
– tmavé zbarvení moči,
– světlé zbarvení stolice,
– bolest v pravé horní části břicha,
– neobvyklá únava (zejména spojená s dalšími výše uvedenými příznaky).

⇨ Neprodleně se poraďte s lékařem, který Vám může doporučit, abyste Valdoxan přestal(a) užívat.