

Datum prvního předepsání
přípravku Xyrem: _____

INFORMACE O KONTAKTECH

Jméno pacienta

Telefonní číslo pacienta

Jméno ošetřující osoby

Telefonní číslo ošetřující osoby

Jméno ošetřujícího lékaře

Telefonní číslo ošetřujícího lékaře

Telefonní číslo na zdravotnickou záchranou službu

Xyrem® (natrii oxybutyras)

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PRO PACIENTY

DODRŽUJTE prosím tyto pokyny

- Mějte kartu pacienta stále u sebe
- Ukažte tuto kartu každému lékaři nebo lékárníkovi, který Vás léčí
- Mějte u sebe seznam všech léků, které užíváte, když jdete k lékaři nebo do lékárny
- Pokud se u Vás vyskytne při užívání Xyremu jakýkoli neobvyklý příznak, informujte neprodleně svého lékaře
- Uchovávejte Xyrem mimo dohled a dosah dětí

Tato informace je součástí programu řízení rizik požadovaného Evropskou agenturou pro léčivé přípravky EMA

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PRO PACIENTY

Xyrem může vyvolat útlum dýchání a poruchu vědomí.

DODRŽUJTE prosím následující:

- **NEPOŽÍVEJTE** alkohol při léčbě Xyremem
- **NEUŽÍVEJTE** větší dávku Xyremu, než Vám předepsal lékař
- **NEŘIĎTE** a neobsluhujte stroje po dobu nejméně 6 hodin po užití Xyremu
- **NEUŽÍVEJTE** jiné léky bez porady se svým lékařem
- **NEDÁVEJTE** Xyrem žádné další osobě.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PRO LÉKAŘE/ FARMACEUTY

Tento pacient užívá Xyrem pro léčbu narkolepsie s kataplexií.

Xyrem může vyvolat útlum dýchání a útlum CNS, záchvaty, deprese a myšlenky na sebevraždu.

Opioidy nebo barbituráty ani další léky způsobující útlum dýchání nebo CNS nesmí být užívány současně s Xyremem. Zvláštní opatrnosti je třeba při současném užívání Xyremu s topiramátem a valproátem.

Xyrem má potenciál pro zneužívání.

Před předepsáním/vydáním dalších léků tomuto pacientovi si, prosím, prostudujte SPC pro Xyrem.