


A. Než přikročíte k aplikaci

Připravte si svůj spotřební materiál


Zvolte si dobře osvětlenou, čistou pracovní plochu a shromážděte na ní veškeré vybavení, které budete potřebovat:



Nová předplněná injekční stříkačka Benepali®

Jednorázová předplněná injekční stříkačka obsahuje jednu dávku 50 mg přípravku Benepali®.

Předplněnou injekční stříkačku **neprotřepávejte**.



1. Zkontrolujte předplněnou injekční stříkačku:

Zkontrolujte dobu použitelnosti na štítku předplněné injekční stříkačky.

Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku poté, co vypršela doba použitelnosti.

Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku, pokud spadla na tvrdý povrch. Může dojít k rozbití součástí uvnitř předplněné injekční stříkačky.

Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku, pokud chybí krytka jehly, nebo když není bezpečně připevněna.

2. Zkontrolujte roztok:

Prohlédněte si léčivý přípravek v předplněné injekční stříkačce.

Léčivý přípravek má být čirý až mírně opalescentní, bezbarvý nebo světle žlutý a může obsahovat malé bílé nebo téměř průhledné částice bílkoviny.

Nepoužívejte roztok, jestliže změnil barvu, je zakalený, nebo jestliže jsou v něm přítomny jiné než výše popsané částice.

3. Nechte léčivý přípravek dosáhnout pokojové teploty:

Z chladničky vyjměte jednu předplněnou injekční stříkačku a nechte ji před injekčním podáním při pokojové teplotě nejméně 30 minut.

Je to důležité, protože pak bude injekční podání léčivého přípravku snadnější a pohodlnější.

Nesnímejte kryt jehly, dokud nebudete připraven/a injekci podat.

K ohřátí přípravku Benepali® **nepoužívejte** tepelné zdroje, jako je například mikrovlnná trouba nebo horká voda.

4. Vyberte místo vpichu injekce:

Předplněná injekční stříkačka Benepali® je určena pro podkožní injekční podání.

Podává se do stehna, krajiny břišní nebo zadní strany horní části paže (viz obrázky vlevo).

Pro každou injekci si vyberte jiné místo.

Pokud injekci podáváte do krajiny břišní, vyberte si místo, které je nejméně 5 cm od pupku.


Nepodávejte injekci do místa, které je zarudlé, tvrdé, pohmožděné nebo bolestivé.

Nepodávejte injekci do jizev a strií.

Jestliže máte lupénku, **nesmíte podat** injekci do jakkoli vyvýšených, tlustých, červených nebo šupinatých kožních polí ani do lézí.


B. Postup aplikace injekce

Krok 1:



Omyjte si ruce mýdlem a vodou.

Krok 2:




Otřete kůži v místě vpichu tampónem namočeným v alkoholu.

Viz „Vyberte místo vpichu injekce“, kde jsou pokyny pro výběr místa vpichu.

Před podáním injekce se tohoto místa již **nedotýkejte**.

Krok 3:



Stáhněte kryt jehly přímým tahem a zlikvidujte jej odhozením do koše nebo nádoby na ostré předměty.


Viz „Vyberte místo vpichu injekce“, kde jsou pokyny pro výběr místa vpichu.

Neotáčejte, ani neohýbejte kryt jehly, když jej odstraňujete, protože to může jehlu poškodit.

Nedotýkejte se táhla pístu při odstraňování krytu jehly.

Nikdy kryt na jehlu znovu nenasazujte.


Krok 4:



Jemným stiskem sevřete kožní řasu v očištěném místě pro vpich injekce. **Předplněnou injekční stříkačku držte v úhlu 45 stupňů vůči kůži. Rychlým pohybem, jako když házíte šípkou, zasuňte jehlu celou do kůže.**


Jakmile bude celá jehla uvnitř, pusťte kůži, kterou svíráte rukou.

Krok 5:



Pomalou stlačujte píst a injikujte veškerý roztok Benepali®.

Krok 6:



Když je injekční stříkačka prázdná, vytáhněte jehlu z kůže a držte jehlu stále pod stejným úhlem jako při vpichu.

Nikdy znovu nezakrýváte jehlu krytem. Opakované zakrytí by mohlo způsobit poranění jehlou.

Likvidace:



Celou injekční stříkačku zlikvidujte ve schválené nádobě na ostré předměty.

Informujte se u svého poskytovatele zdravotní péče na pokyny, jak správně likvidovat plně odpadní nádoby na ostré předměty.

Neodhazujte odpadní nádobu na ostré předměty do domácího odpadu.

Nerecyklujte

Předplněnou injekční stříkačku přípravku Benepali® **nepoužívejte** opakovaně.

Uchovávejte tuto nádobu mimo dohled a dosah dětí.

C. Péče o místo vpichu injekce

Pokud dojde ke krvácení v místě vpichu, přitlačte na místo vpichu gázový tampón.

Místo vpichu **netřete**.

Podle potřeby místo vpichu přelepte náplastí.



Nějaké otázky?

Zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Viz Návod k použití.

Jestliže vám na vaše otázky neodpoví váš lékař nebo zdravotní sestra, lékařské informace a postupy při hlášení nežádoucích účinků si můžete vyžádat na kontaktních telefonních číslech místních zástupců uvedených v příbalovém letáku.

