Monitorovací schéma funkce jater při užívání Valdoxanu

❑ **Valdoxan 25 mg**

❑ Před zahájením léčby dávkou 25 mg	ALT	.....µkat/l
	AST	.....µkat/l
❑ Týden 3	ALT	.....µkat/l
	AST	.....µkat/l
❑ Týden 6	ALT	.....µkat/l
	AST	.....µkat/l
❑ Týden 12	ALT	.....µkat/l
	AST	.....µkat/l
❑ Týden 24	ALT	.....µkat/l
	AST	.....µkat/l

Prosím proveďte test kdykoliv, pokud je klinicky indikováno.

❑ V případě zvýšení dávky na **50 mg**, znovuzahájení monitorovacího schématu.

❑ Zahájení léčby dávkou 50mg	ALT	.....µkat/l
	AST	.....µkat/l
❑ Týden 3	ALT	.....µkat/l
	AST	.....µkat/l
❑ Týden 6	ALT	.....µkat/l
	AST	.....µkat/l
❑ Týden 12	ALT	.....µkat/l
	AST	.....µkat/l
❑Týden 24	ALT	.....µkat/l
	AST	.....µkat/l

Prosím proveďte test kdykoliv, pokud je klinicky indikováno.

Jméno pacienta: _____

Datum zahájení léčby: _____

Symptomy nebo jakýkoliv projev možného jaterního poškození*

Sérové transaminázy (ALT, AST)

ALT A/NEBO AST **> 3násobek horního limitu normálního rozmezí**

ALT A/NEBO AST **≤ 3násobek horního limitu normálního rozmezí**

Normální

Symptomy nebo jakýkoliv projev možného jaterního poškození*

Žádný symptom nebo projev jaterního poškození
Zopakujte testy jaterních funkcí do 48 hodin

ALT A/NEBO AST **> 3násobek horního limitu normálního rozmezí**

ALT A/NEBO AST **≤ 3násobek horního limitu normálního rozmezí**

- **Ukončete léčbu**
- Měly by být provedeny testy jaterních funkcí (včetně transamináz)

- **Ukončete léčbu**
- Opakujte testy jaterních funkcí pravidelně dokud se sérové transaminázy nevrátí k normálu

- **Pokračujte v léčbě**
- Dodržujte časový harmonogram jaterních monitorovacích testů

* Jako je tmavá moč, světlé zbarvení stolice, zežloutnutí kůže/očí, bolest v pravé horní části břicha, neustupující nově vzniklá a nevysvětlitelná únava