



EDUKAČNÍ MATERIÁL, KONTROLNÍ SEZNAM, Předepisování EpiPen®/EpiPen® Jr.

Příjmení / Jméno

Datum narození

Datum

1

Bylo u Vašeho pacienta diagnostikováno riziko
nebo dřívější výskyt anafylaktické reakce?

☐ ANO

2

Je pacient seznámen s tím, kdy si musí adrenalin podat?

☐ ANO, a už EpiPen®/
EpiPen® Jr. používá

► Pokračujte **3. KROKEM**

☐ ANO, ale EpiPen®/
EpiPen® Jr. zatím nepoužívá

► Pokračujte **2. KROKEM**

☐ NE

► Pokračujte **1. KROKEM**

1. KROK: Už jste vysvětlil(a) pacientovi, jak se chovat v případě kontaktu s alergenem a kdy si musí adrenalin podat?

☐ ANO

► Pokračujte **2. KROKEM**

2. KROK: Už jste pacientovi představil(a) EpiPen® / EpiPen® Jr. a ukázal(a) přesné kroky, jak jej používat s využitím cvičné pomůcky a promítnutím videa „Jak používat EpiPen® / EpiPen® Jr.“ (Více informací najdete na zadní straně)

☐ ANO

► Pokračujte **3. KROKEM**

3. KROK: Už jste požádal(a) pacienta, aby Vám předvedl manipulaci s cvičnou pomůckou EpiPen® / EpiPen® Jr.?

☐ ANO

3

Už jste pacientovi doporučil(a) pravidelný
návštěv aplikace a zaškolení všech blízkých?

☐ ANO

4

Už jste pacientovi doporučil(a) nosit s sebou
vždy 2 autoinjektory EpiPen® / EpiPen® Jr. pro
případ, že se příznaky nezlepší a bude potřebná
druhá dávka?

☐ ANO

5

Už jste poradil(a) pacientovi, aby si nastavil
připomínku týkající se data expirace
autoinjektoru EpiPen® / EpiPen® Jr. tak, aby si
jej včas vyměnil?

☐ ANO



Jak POUŽÍVAT EpiPen®/EpiPen® Jr.?


Vyndejte **EpiPen® / EpiPen® Jr.** z přenosného pouzdra. Lehněte si s nohama ve zvýšené poloze, abyste usnadnili průtok Vaší krve nebo se posaďte, pokud se Vám těžko dýchá.

1.




Uchopte **EpiPen® / EpiPen® Jr.** do dominantní ruky (pravák do pravé, levák do levé), palec položte co nejbližší k modrému pojistnému uzávěru, sevřete pevně ruku kolem pera **EpiPen® / EpiPen® Jr.** a vytáhněte tento modrý pojistný uzávěr. Pamatujte si: „Modré do nebe, oranžové do stehna.“

2.




Podržte **EpiPen® / EpiPen® Jr.** ve vzdálenosti asi 10 cm od vnější strany stehna. Oranžový hrot musí mířit na vnější stranu stehna.

3.



Pevně a ve správném úhlu (90 stupňů vzhledem k vnější straně stehna) zabodněte pero **EpiPen®/EpiPen® Jr.** do vnější části stehna. Po dobu 10 sekund držte pero pevně na stehně.

4.



EpiPen® / EpiPen® Jr. odstraňte a bezpečně zlikvidujte. Po použití se oranžový kryt jehly automaticky vysune tak, že zakryje jehlu.

5.



Po dobu 10 sekund oblast vpichu masírujte. Zavolejte rychlou záchrannou službu na lince 155 nebo tísňovou linku 112, požádejte o lékařskou pomoc a informujte personál, že se jedná o anafylaktický šok.

Každý EpiPen® / EpiPen® Jr. lze použít pouze jednou. Pokud se příznaky nezlepší, po 5-15 minutách si můžete podat druhý EpiPen® / EpiPen® Jr.

Jak UCHOVÁVAT EpiPen®/EpiPen® Jr.

- **EpiPen® / EpiPen® Jr.** uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem.
- Uchovávejte pouzdro v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Při vystavení vzduchu nebo světlu se adrenalin rychle znehodnocuje a mění barvu na růžovou nebo hnědou.
- Nezapomeňte občas zkontrolovat, zda je obsah skleněného zásobníku pera **EpiPen®/EpiPen® Jr.** Auto-Injektor stále čistý a bezbarvý.
- Vyměňte **EpiPen® / EpiPen® Jr.** autoinjektor před uplynutím doby použitelnosti nebo dříve, pokud roztok změní barvu nebo obsahuje sraženinu.

Jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob musí být hlášeno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Podrobnosti o hlášení najdete na: <http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek>. Adresa pro zaslání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz. Tato informace může být také hlášena společnosti Meda Pharma s.r.o. (součást skupiny Mylan) na tel. číslo +420 222 004 400 nebo email officecz@mylan.com.