

ENBREL®

KARTA PACIENTA

Tato karta obsahuje důležité informace o bezpečnosti, které potřebujete vědět dříve, než poprvé dostanete přípravek Enbrel® a po celou dobu jeho aplikace. Pokud Vám cokoli z níže uvedených informací nebude jasné, prosím, požádejte svého lékaře o vysvětlení.

- Ukažte tuto kartu každému lékaři, který se podílí na Vaší léčbě.
- Vždy si přečtěte také *Příbalovou informaci pro pacienty*, která obsahuje další důležité informace.
- Ponechte si tuto kartu ještě po dobu 2 měsíců od podání poslední dávky přípravku Enbrel®, protože nežádoucí účinky se mohou vyskytnout i po podání poslední dávky.

Karta pacienta var. 2
74x105 mm, 4 strany



INFEKCE

Přípravek Enbrel® může zvýšit riziko vzniku infekcí, které mohou být závažné.

● Pokud máte infekční onemocnění, neužívejte přípravek Enbrel®. Nejste-li si jistý/á, zeptejte se svého lékaře.

● Pokud se u Vás objeví příznaky svědčící o infekci jako jsou horečka, přetrvávající kašel, úbytek na váze nebo apatie (zvýšená únavnost, lhostejnost), okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

● Měl/a byste být vyšetřen/a na tuberkulózu (TB). Požádejte svého lékaře, aby zapsal data a výsledky Vašeho posledního screeningového vyšetření na tuberkulózu do níže uvedených položek:

Test: Datum:

Výsledek:

Test: Datum:

Výsledek:

Prosím, požádejte svého praktického lékaře, aby níže uvedl seznam všech Vašich léků, které mohou zvyšovat riziko infekce.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MĚSTNAVÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ

Pokud se u Vás rozvinou příznaky městnavého srdečního selhání nebo zhoršení stávajícího srdečního selhávání jako jsou dušnost, otok kotníků, přetrvávající kašel nebo únava, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

DALŠÍ INFORMACE

(prosím vyplnit)

.....
Jméno pacienta

.....
Jméno lékaře

.....
Telefon lékaře



Pracujeme společně pro zdravější svět™

Pfizer PFE spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5
tel.: +420 283 004 111, fax: +420 251 610 270, www.pfizer.cz

ENB-2017.01.006