

KEYTRUDA® (pembrolizumab)

Může způsobit vážné nežádoucí účinky. Ve stejnou dobu Vás může postihnout i více nežádoucích účinků.

Ihned kontaktujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví jakékoli níže uvedené projevy nebo příznaky. Lékař Vám může dát jiné léky, aby zabránil závažnějším komplikacím nebo může být třeba odložit další dávku přípravku nebo léčbu ukončit.

Další údaje naleznete
v příbalové informaci
k přípravku KEYTRUDA

DŮLEŽITÉ

- Nepokoušejte se nežádoucí účinky diagnostikovat nebo léčit sami.
- Tuto kartu noste stále s sebou, zvláště pokud cestujete, kdykoli jdete na pohotovost nebo když musíte navštívit jiného lékaře.
- Nezapomeňte uvědomit každého zdravotnického pracovníka, kterého navštívíte, že se léčíte přípravkem KEYTRUDA a ukažte mu tuto kartu.

Komplikace způsobené transplantací kmenových buněk s využitím dárcovských buněk při léčbě přípravkem KEYTRUDA. Tyto komplikace mohou být závažné a mohou vést k úmrtí. Váš lékař Vás bude kontrolovat na příznaky těchto komplikací. Sdělte svému lékaři, který provádí transplantaci, že jste v minulosti dostal(a) pembrolizumab.

Plíce

- Dušnost
- Bolest na hrudi
- Kašel

Střeva

- Průjem nebo častější pohyby střev, než je obvyklé
- Černá, dehtovitá, lepivá stolice nebo stolice s krví nebo hlenem
- Silná bolest nebo citlivost břicha
- Nevolnost nebo zvracení

Játra

- Nevolnost nebo zvracení
- Menší pocit hladu
- Bolest na pravé straně břicha
- Zežloutnutí kůže nebo bělma očí
- Tmavá moč
- Snadnější krvácení nebo tvorba modřin, než je obvyklé

Ledviny

- Změny množství nebo barvy moči

Žlázy s vnitřní sekrecí

- Rychlý tep
- Snížení tělesné hmotnosti
- Zvýšení tělesné hmotnosti
- Zvýšené pocení
- Vypadávání vlasů
- Pocit chladu
- Zácpa
- Hlubší hlas
- Svalové bolesti

- Závrať nebo upadnutí do bezvědomí
- Bolesti hlavy, které nemizí, nebo neobvyklé bolesti hlavy

Cukrovka typu 1

- Silnější pocit hladu nebo žízně
- Častější potřeba močení
- Snížení tělesné hmotnosti

Kůže

- Vyrážka
- Svědění
- Puchýře na kůži
- Olupování kůže nebo boláky na kůži
- Vředy v ústech nebo sliznici nosu, hrdla nebo v oblasti pohlavních orgánů

Jiné orgány

- Oči: změny vidění
- Svaly: bolest nebo slabost
- Srdce: dušnost, nepravidelný tep, únava nebo bolest na hrudi
- Slinivka břišní: bolest břicha, nevolnost a zvracení
- Nervy: přechodný zánět, který způsobuje bolest, slabost a ochrnutí rukou a nohou
- Rejekce (odmítnutí) transplantátu solidního orgánu po léčbě pembrolizumabem (oznamte svému lékaři, pokud jste podstoupil(a) transplantaci solidního orgánu)

Infuzní reakce

- Dušnost
- Svědění nebo vyrážka
- Závrať
- Horečka

Důležité kontaktní informace

Jméno lékaře

Telefon do ordinace

Telefon po ordinačních hodinách

Moje jméno

Můj telefon

Kontakt pro naléhavé situace (jméno a telefon)

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Důležité informace pro zdravotnické pracovníky

Tento pacient se léčí přípravkem KEYTRUDA® (pembrolizumab), který může vyvolat imunitně zprostředkované závažné nežádoucí účinky, které postihují plíce, střeva, játra, ledviny, žlázy s vnitřní sekrecí, kůži a další orgány, stejně jako nežádoucí účinky spojené s infuzí.

Pokud máte jakékoliv otázky k přípravku KEYTRUDA nebo k jeho fungování, obraťte se na svého lékaře. Pro další detailnější informace k přípravku (SmPC) navštivte databázi léků na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv:
<http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0210911&tab=texts>