PŘIPOMÍNKOVÁ KARTA PACIENTA

Důležité bezpečnostní upozornění pro pacienty užívající přípravek Bosentan Ebewe
Tato karta obsahuje důležité informace o přípravku Bosentan Ebewe. Přečtěte si prosím tuto kartu pečlivě, než začnete léčbu přípravkem Bosentan Ebewe.

Vaše jméno: _____
Předepisující lékař: _____

Pokud máte otázky k přípravku Bosentan Ebewe, zeptejte se svého lékaře.

Pokud jste pacientka v plodném věku, přečtěte si pečlivě tuto stránku

Těhotenství
Přípravek Bosentan Ebewe může narušit vývoj plodu. Proto nesmíte přípravek Bosentan Ebewe užívat, pokud jste těhotná a rovněž nesmíte během užívání přípravku Bosentan Ebewe otěhotnět.
Navíc, pokud se léčíte na plicní hypertenzi, může otěhotnění závažně zhoršit příznaky choroby. Pokud máte podezření, že byste mohla být těhotná, sdělte to svému lékaři nebo gynekologovi.

Antikoncepce
Hormonální antikoncepce – jako je perorální antikoncepce neboli antikoncepční pilulky, hormonální injekce, implantáty nebo antikoncepční náplasti u žen, které užívají přípravek Bosentan Ebewe, těhotenství spolehlivě nezabrání. Je třeba, abyste vedle kteréhokoli typu hormonální antikoncepce užívala bariérovou metodu antikoncepce – jako je kondom, pesar nebo vaginální houba. Nezapomeňte probrat se svým lékařem nebo gynekologem všechny otázky, které Vás napadnou – podrobnosti vypište na zadní stranu této karty a vezměte ji s sebou při další návštěvě lékaře nebo gynekologa.

Předtím, než začnete užívat přípravek Bosentan Ebewe a každý měsíc během léčby si musíte udělat těhotenský test, i když si myslíte, že nejste těhotná.

Datum prvního testu: _____

Antikoncepce
Používáte v současné době nějakou antikoncepci?
☐ Ano ☐ Ne

Pokud ano, napište sem jejich názvy:
_____
_____

Vezměte s sebou tuto kartu při další návštěvě lékaře nebo gynekologa a ten Vám poradí ohledně potřeby další nebo alternativní metody antikoncepce.

Měsíční těhotenské testy provedeny:

☐ Leden ☐ Květen ☐ Září

☐ Únor ☐ Červen ☐ Říjen

☐ Březen ☐ Červenec ☐ Listopad

☐ Duben ☐ Srpen ☐ Prosinec

Krevní test jaterních funkcí

U některých pacientů užívajících přípravek Bosentan Ebewe byly zjištěny abnormální výsledky testů jaterních funkcí. Během léčby přípravkem Bosentan Ebewe Váš lékař zařídí pravidelné krevní testy s cílem zjistit změny jaterních funkcí.

Nezapomeňte si nechat udělat krevní test jaterních funkcí každý měsíc.
Po zvýšení dávky se po 2 týdnech provede další test.

Datum prvního testu: _____

Rozpis krevních testů jaterních funkcí:

☐ Leden ☐ Květen ☐ Září

☐ Únor ☐ Červen ☐ Říjen

☐ Březen ☐ Červenec ☐ Listopad

☐ Duben ☐ Srpen ☐ Prosinec