

# BENEPALI<sup>®</sup> (ETANERCEPTUM)

## STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA

---

**Předplněná injekční  
stříkačka Benepali<sup>®</sup>**

**Benepali<sup>®</sup>**

(PFSyringe) CZ verze 2.0  
datum schválení:  
11. září 2017

▼ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Než začnete používat přípravek Benepali® a vždy, když vám bude přípravek opakovaně vydán, si přečtěte **návod k použití**. Může obsahovat nové informace.

Tato **stručná referenční příručka** není určena jako náhrada příslušného návodu k použití.

**Nepokoušejte** se aplikovat si injekci, pokud vám váš lékař nebo zdravotní sestra neukázali, jak na to.

(PFSyringe) CZ verze 2.0  
datum schválení: 11. září 2017



## Jak aplikovat přípravek Benepali® pomocí předplněné injekční stříkačky

Cílem této příručky je popis správného postupu pro bezpečnou a účinnou aplikaci injekce.

Před aplikací přípravku Benepali® si prostudujte **Návod k použití a příbalovou informaci**, kde jsou uvedeny důležité informace, které byste si měli pamatovat. Mezi ně patří informace o možných alergických reakcích, vedlejších účincích a okolnostech, za kterých je přípravek Benepali® zakázáno používat.

Před použitím přípravku Benepali® a pokládá, když odříznete nové balení na základě lékařského předpisu, si přečtěte **Návod k použití a příbalovou informaci**, kde jsou obsaženy důležité informace. Mohou obsahovat nové informace.

**Nepokoušejte** si aplikovat injekci, pokud vám váš lékař nebo zdravotní sestra neukázali, jak na to.



## A. Než přikročíte k aplikaci

### Připravte si pomocný materiál


**Zvolte si dobře osvětlenou, čistou pracovní plochu a shromážděte na ní veškeré vybavení, které budete potřebovat:**



### Nová předplněná injekční stříkačka Benepali®

Jednorázová předplněná injekční stříkačka obsahuje jednu dávku přípravku Benepali®.

Předplněnou injekční stříkačku **neprotřepávejte**.



### 1. Zkontrolujte předplněnou injekční stříkačku:

Zkontrolujte dobu použitelnosti na štítku předplněné injekční stříkačky.

**Nepoužívejte** předplněnou injekční stříkačku poté, co vypršela doba použitelnosti.

**Nepoužívejte** předplněnou injekční stříkačku, pokud spadla na tvrdý povrch. Může dojít k rozbití součástí uvnitř předplněné injekční stříkačky.

**Nepoužívejte** předplněnou injekční stříkačku, pokud chybí krytka jehly, nebo když není bezpečně připevněna.

### 2. Zkontrolujte roztok:

Prohlédněte si léčivý přípravek v předplněné injekční stříkačce.

Léčivý přípravek má být čirý až mírně opalescentní, bezbarvý nebo světle žlutý a může obsahovat malé bílé nebo téměř průhledné částice bílkoviny.

**Nepoužívejte** roztok, jestliže změnil barvu, je zakalený, nebo jestliže jsou v něm přítomny jiné než výše popsané částice.

### 3. Nechte léčivý přípravek dosáhnout pokojové teploty:

Z chladničky vyjměte jednu předplněnou injekční stříkačku a nechte ji před injekčním podáním při pokojové teplotě nejméně 30 minut.

Je to důležité, protože pak bude injekční podání léčivého přípravku snadnější a pohodlnější.

**Nesnímejte** kryt jehly, dokud nebudete připraven/a injekci podat.

K ohřátí přípravku Benepali® **nepoužívejte** tepelné zdroje, jako je například mikrovlnná trouba nebo horká voda.

### 4. Vyberte místo vpichu injekce:

Předplněná injekční stříkačka Benepali® je určena pro podkožní injekční podání. Podává se do stehna, krajiny břišní nebo zadní strany horní části paže (viz obrázek vlevo).

Pro každou injekci si vyberte jiné místo.

Pokud injekci podáváte do krajiny břišní, vyberte si místo, které je nejméně 5 cm od pupku.

**Nepodávejte** injekci do místa, které je zarudlé, tvrdé, pohmožděné nebo bolestivé.


**Nepodávejte** injekci do jizev a tříř.

Jestliže máte lupénku, **nesmíte podat** injekci do jakkoli vyvýšených, tlustých, červených nebo šupinatých kožních polí ani do lézí.




## B. Postup aplikace injekce

### Krok 1:



Omyjte si ruce mýdlem a vodou.

### Krok 2:




Otřete kůži v místě vpichu tampónem namočeným v alkoholu.

Viz „Vyberte místo vpichu injekce“, kde jsou pokyny pro výběr místa vpichu.

Před podáním injekce se tohoto místa již **nedotýkejte**.

### Krok 3:



Stáhněte kryt jehly přímým tahem a zlikvidujte jej odhozením do koše nebo nádoby na ostré předměty.


Viz „Vyberte místo vpichu injekce“, kde jsou pokyny pro výběr místa vpichu.

**Neotáčejte**, ani neohýbejte kryt jehly, když jej odstraňujete, protože to může jehlu poškodit.

**Nedotýkejte** se táhla pístu při odstraňování krytu jehly.

**Nikdy kryt na jehlu znovu nenasazujte.**


### Krok 4:



Jemným stiskem sevřete kožní řasu v očištěném místě pro vpich injekce. Předplněnou injekční stříkačku držte v úhlu 45 stupňů vůči kůži. Rychlým pohybem, jako když házíte šipkou, zasuňte jehlu celou do kůže.


Jakmile bude celá jehla uvnitř, pusťte kůži, kterou svíráte rukou.

### Krok 5:



Pomalou stlačujte píst a injikujte veškerý roztok Benepali®.

### Krok 6:



Když je injekční stříkačka prázdná, vytáhněte jehlu z kůže a držte jehlu stále pod stejným úhlem jako při vpichu.

**Nikdy** znovu nezakryjte jehlu krytem. Opakované zakrytí by mohlo způsobit poranění jehlou.

### Likvidace:



Celou injekční stříkačku zlikvidujte ve schválené nádobě na ostré předměty.

Informujte se u svého poskytovatele zdravotní péče na pokyny, jak správně likvidovat plně odpadní nádoby na ostré předměty.

**Neodhazujte** odpadní nádobu na ostré předměty do domácího odpadu.

**Nerecyklujte**

Předplněnou injekční stříkačku přípravku Benepali® **nepoužívejte** opakovaně.

**Uchovávejte tuto nádobu mimo dohled a dosah dětí.**



## C. Péče o místo vpichu injekce

Pokud dojde ke krvácení v místě vpichu, přitlačte na místo vpichu gázový tampón.

Místo vpichu **netřete**.

Podle potřeby místo vpichu přelepte náplastí.



### Nějaké otázky?

Zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Viz **Návod k použití**.

Jestliže vám na vaše otázky neodpoví váš lékař nebo zdravotní sestra, lékařské informace a postupy při hlášení nežádoucích účinků si můžete vyžádat na kontaktních telefonních číslech místních zástupců uvedených v příbalovém letáku.

Patent and trademark used under license: www.szard.be No. 00000/00

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: [www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek)

Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: [farmakovigilance@sukl.cz](mailto:farmakovigilance@sukl.cz)

Prosíme, do hlášení uvádějte přesný obchodní název a číslo šarže biologického léčiva. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Hlášení může být také zasláno společnosti Biogen (Czech Republic) s.r.o. na adresu: Biogen (Czech Republic) s.r.o. Na Pankráci 1683/127 140 00 Praha 4 Email: [MedInfo\\_Biogen@quintiles.com](mailto:MedInfo_Biogen@quintiles.com) Tel.: +420 255 706 208

