

Příbalová informace VP

## **JODID DRASELNÝ 65 mg hameln**

(Kalii iodidum)

tablety

### **Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.**

Tento léčivý přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek JODID DRASELNÝ 65 mg hameln musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

### **V této příbalové informaci naleznete:**

1. Co je JODID DRASELNÝ 65 mg hameln a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek JODID DRASELNÝ 65 mg hameln užívat
3. Jak se JODID DRASELNÝ 65 mg hameln užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek JODID DRASELNÝ 65 mg hameln uchovávat
6. Další informace

### **1. Co je JODID DRASELNÝ 65 mg hameln a k čemu se používá**

JODID DRASELNÝ 65 mg hameln patří do skupiny léčiv nazývaných varia (antidota).

V případě radioaktivního záření, kdy se uvolňuje radioaktivní jod, může jodid draselný zabránit poškození štítné žlázy tím, že se štítná žláza nasytí neradioaktivním jodem. Tím se zabrání příjmu radioaktivního jodu z kontaminovaného vzduchu, vody, mléka a jiné potravy.

JODID DRASELNÝ 65 mg hameln se používá preventivně při kontaminaci radioaktivním jodem.

### **2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek JODID DRASELNÝ 65 mg hameln užívat**

Neužívejte JODID DRASELNÝ 65 mg hameln

Přípravek nesmí být užíván v případech známé přecitlivělosti (hypersenzitivity, alergie) na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, zejména při známé přecitlivělosti na jodové preparáty.

Zvláštní opatření při použití přípravku JODID DRASELNÝ 65 mg hameln je zapotřebí

Užití vyšších dávek jodidu draselného nezvyšuje ochranný efekt.

V případě alergické reakce je třeba vyhledat lékaře.

Osoby s poruchou funkce štítné žlázy musí urychleně konzultovat stav a možnost použití jodidu draselného s ošetřujícím lékařem resp. specialistou.

#### Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Účinky přípravku JODID DRASELNÝ 65 mg hameln a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Prosím, informujte svého lékaře o všech přípravcích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

#### Těhotenství a kojení:

V případě radiční nehody nebo havárie mohou přípravek užívat těhotné i kojící ženy; užívání dalších dávek a délka podávání se řídí pokyny příslušných orgánů nebo lékaře.

#### Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Možnost tohoto ovlivnění nebyla u přípravku stanovena.

### **3. Jak se JODID DRASELNÝ 65 mg hameln užívá**

Jodová profylaxe se v případě radiční havárie vykonává u všech osob včetně těhotných a kojících žen. Výjimku tvoří osoby precitlivělé na jodové preparáty nebo ty osoby, které se léčí anebo léčí na poruchy funkce štítné žlázy. Při nejasnostech je třeba se poradit s obvodním nebo ošetřujícím lékařem.

Při vyhlášení radiční havárie a na výzvu užijí obyvatelé tyto dávky jodidu draselného:

- novorozenci do 1 měsíce věku . . . . . 1/4 tbl. = 16 mg KI
- kojenci a děti od 1 měsíce do 3 let . . . . . 1/2 tbl. = 32 mg KI
- děti od 3 let do 12 let . . . . . 1 tbl. = 65 mg KI
- dospělí a děti od 12 let . . . . . 2 tbl. = 130 mg KI

**V PŘÍPADĚ JADERNÉ HAVÁRIE JE TŘEBA JODID DRASELNÝ PODAT DO 1 HODINY OD VZNIKU NEBEZPEČÍ.**

Bude-li to radiční situace vyžadovat, oznámí se obyvatelům, aby po 24 nebo 48 hodinách užili ještě poloviční dávku jodidu draselného.

Novorozencům se další dávky nepodávají.

Těhotným a kojícím ženám se podávají maximálně dvě dávky.

### **4. Možné nežádoucí účinky**

Vyskytují se až po vysokých dávkách a dlouhodobém užívání. Ojedinele se mohou vyskytnout poruchy trávicího ústrojí, zvýšená teplota, změny na kůži, vlasech, nehtech, nevolnost.

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poradte s lékařem.

### **5. Jak přípravek JODID DRASELNÝ 65 mg hameln uchovávat**

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužitelný lék nevyhazujte, bude vyměněn.

#### **6. Další informace**

Co přípravek JODID DRASELNÝ 65 mg hameln obsahuje

Léčivou látkou je kalii iodidum 65 mg v jedné tabletě.

Pomocné látky jsou: mikrokrytalická celulóza, mastek, makrogol 6 000, koloidní bezvodý oxid křemičitý

Co obsahuje balení

Balení obsahuje 4 tablety.

Držitel rozhodnutí o registraci/Výrobce:

hameln rds a.s., Horná 36, Modra, Slovenská republika

**Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 18. 5. 2011**