

## LEK-5 verze 2 Doporučené doby použitelnosti léčivých přípravků připravovaných v lékárně

Tento pokyn nahrazuje pokyn LEK-5 verze 1 s platností od 1.10.2009.

### Oční kapky připravované v lékárně a uchovávané v konečném obalu určeném k výdeji

Použitelnost po prvním otevření vždy maximálně 1 měsíc.

Název léčivého přípravku	Maximální doporučená doba použitelnosti	Způsob skladování
Acidi borici aqua ophthalmica ČL 2009	3 měsíce	Chránit před světlem.
Acidi borici oculo guttae ČL 2009	3 měsíce	Chránit před světlem.
Argentii diacetyltannatis albuminati oculo guttae c.a., isot. (do 3%)	3 týdny	Při teplotě 8°C až 15°C, chránit před světlem.
Cinchocaini hydrochloridi oculo guttae 0,2%, c.a., isot.	2 měsíce	Chránit před světlem.
Ethylmorphini hydrochloridi oculo guttae ČL 2009 (do 3%)	2 měsíce	Chránit před světlem.
Homatropini hydrobromidi oculo guttae ČL 2009	2 měsíce	Chránit před světlem.
Chloramphenicoli oculo guttae ČL 2009	3 měsíce	Chránit před světlem.
Natrii tetraboratis oculo guttae, cum acido borico ČL 2009	3 měsíce	Chránit před světlem.
Natrii tetraboratis oculo guttae, sine acido borico ČL 2009	3 měsíce	Chránit před světlem.
Scopolamini hydrobromidi oculo guttae c.a., isot. (do 0,25%)	2 měsíce	Při teplotě 8°C až 15°C, chránit před světlem.
Zinci sulfatis oculo guttae ČL 2009	3 měsíce	Chránit před světlem.

### Ostatní léčivé přípravky připravované v lékárně

Název léčivého přípravku	Maximální doporučená doba použitelnosti	Způsob skladování
Acidi borici solutio 3% ČL 2009	1 měsíc	Chránit před světlem.
Acidi borici solutio ethanolica (1% až 3%)	2 měsíce	Chránit před světlem.
Acidi borici unguentum 10% ČL 2009	2 měsíce	Chránit před světlem.
Acidum hydrochloricum 10% ČL 2009	6 měsíců	
Acidi salicylici solutio ethanolica ČL 2009	2 měsíce	Chránit před světlem.
Acidi salicylici unguentum 10% ČL 2009	6 měsíců	Chránit před světlem.
Aluminii acetotartratis oculo guttae ČL 2009	1 měsíc	Chránit před světlem.
Aqua conservans ČL 2009	3 měsíce	Chránit před světlem.
Argentii nitratis unguentum compositum ČL 2009	3 týdny	Při teplotě do 25°C, chránit před světlem.
Calcii chloridi solutio ČL 2009	3 měsíce	
Calcii hydroxidi solutio ČL 2009	6 měsíců	Nad sraženinou hydroxidu vápenatého ve zcela naplněných a dobře uzavřených obalech odolných proti alkalickým látkám.

Ethanolum 60% ČL 2009	6 měsíců	
Formaldehydi Kutvirti gargarisma ČL 2009	3 měsíce	
Glyceroli unguentum ČL 2009	1 měsíc	Chránit před světlem.
Hydrogenii peroxidum 3% ČL 2009	3 měsíce	Chránit před světlem.
Iodi solutio aquosa ČL 2009	2 měsíce	Ve skleněných obalech, chránit před světlem.
Iodi solutio ethanolica ČL 2009	2 měsíce	Ve skleněných obalech, chránit před světlem.
Iodi solutio glycerolica ČL 2009	2 měsíce	Ve skleněných obalech, chránit před světlem.
Methylrosanilini chloridi solutio 1% ČL 2009	6 měsíců	Při teplotě do 25°C, chránit před světlem
Methylrosanilini chloridi solutio 0,5% ČL 2009	2 měsíce	Při teplotě do 25°C, chránit před světlem.
Natrii tetraboratis globulus ČL 2009	2 měsíce	Při teplotě do 20°C, chránit před světlem a mrazem.
Natrii tetraboratis solutio glycerolica ČL 2009	2 měsíce	
Salia pro gargarismate pulvis ČL 2009	2 měsíce	Chránit před světlem, uchovávat v suchu.
Sirupus simplex ČL 2009	3 měsíce	Ve zcela naplněných obalech, chránit před světlem.
Solutio ethacridinii lactici 0,05% až 1,0%	3 týdny	Chránit před světlem.
Solutio Jarisch ČL 2009	1 měsíc	Chránit před světlem.
Solutio Novikov, P.P. 53, Farm. Obzor 4/92	3 měsíce	Při teplotě 8°C až 15°C, chránit před světlem.
Spiritus ethereus ČL 2009	1 měsíc	Při teplotě 8°C až 15°C, chránit před světlem.
Sulfuris suspensio ČL 2009	1 měsíc	Při teplotě 8°C až 15°C, chránit před světlem.
Suspensio Višněvski cum balsamo peruviano Farm. obzor 4/92	3 měsíce	Při teplotě 8°C až 15°C.
Suspensio Višněvski cum pice liquida Farm. obzor 4/92, P.P. 53	3 měsíce	Při teplotě 8°C až 15°C.
Unguentum Holt P.P.72 Cremor Holt ZKM 186	2 měsíce	
Unguentum molle ČL 2009	2 měsíce	Při teplotě 8°C až 15°C, chránit před světlem.
Unguentum Whitfield ČL 2009	3 měsíce	Při teplotě 8°C až 15°C, chránit před světlem.
Zinci oxidi pasta ČL 2009	9 měsíců	Při teplotě do 25°C, chránit před světlem.
Zinci oxidi pasta 50% ČL 2009	9 měsíců	Při teplotě do 25°C, chránit před světlem.
Zinci oxidi suspensio ČL 2009	2 měsíce	

Pozn.:

1. Pokud není uvedena teplota skladování, léčivé přípravky jsou skladovány při teplotě 15°C až 25°C.
2. Pokud není uveden požadavek na vlastnosti obalu, pro skladování léčivého přípravku se použije obal dobře uzavřený.

**Léčivé látky, pomocné látky a léčivé přípravky dodávané do lékáren a rozvažované v lékárně do konečného obalu**

Dobu použitelnosti po rozplnění může určit lékárník na základě druhu léčivého přípravku, maximálně však na 2 měsíce v rámci doby použitelnosti stanovené výrobcem.

**Léčivé látky a pomocné látky rozvažované v lékárně do konečného obalu**

Doba použitelnosti nejvýše 6 měsíců v rámci doby použitelnosti stanovené výrobcem.

**Léčivé přípravky připravované v lékárně individuálně pomocí technologie v uzavřeném systému**

1. U individuálně připravených léčivých přípravků může lékárník prodloužit obvyklou dobu použitelnosti na dobu maximálně 3 měsíců (u forem tekutých a polotuhých) za podmínek přípravy a dispensace v uzavřeném systému a při použití k tomu uzpůsobených obalů (např. typ Unguator®).

2. Dobu použitelnosti léčivých přípravků dodávaných do lékáren jako léčivé přípravky v režimu léčivých látek a pomocných látek může lékárník prodloužit maximálně na 6 měsíců v rámci doby použitelnosti stanovené výrobcem a to za podmínek rozplnění do menšího dispenzačního obalu (např. typ Unguator®) v uzavřeném systému.

**Roztoky injekčně podávaných cytostatik připravovaných v lékárně**

Doba použitelnosti u naředěných cytostatik je uvedena v souhrnu údajů o přípravku (SPC).

**Léčivé přípravky, které nejsou výše uvedeny**

Dobu použitelnosti může lékárník určit podle charakteru léčivého přípravku, podle délky léčebné kúry maximálně na 1 měsíc, u pevných dělených lékových forem maximálně na 3 měsíce.