

Tuto kartičku mějte neustále u sebe a ukažte ji každému lékaři, který Vás bude léčit.

Prosím, uveďte datum Vašeho posledního vyšetření na TBC:

Infekce

Cimzia zvyšuje riziko vzniku infekcí. Infekce se mohou mnohem rychleji zhoršovat a mohou mít závažnější průběh. Toto zahrnuje i tuberkulózu (TBC).

Před zahájením léčby Cimzií

- Cimzií nesmíte být léčen(a), pokud trpíte závažnou infekcí.
- Cimzií nesmíte být léčen(a), pokud trpíte hepatitidou B.
- Měl(a) byste být vyšetřen(a) na TBC. Je velmi důležité, abyste svého lékaře informoval(a), že jste prodělal(a) TBC nebo jste byl(a) v blízkém kontaktu s osobou/osobami trpícími TBC.

Tuberkulinový test:

RTG hrudníku:

Během léčby Cimzií

- Pokud se u Vás projeví příznaky naznačující infekci, jako je horečka, přetrvávající kašel, úbytek hmotnosti či netečnost (apatie), vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Zhoubné nádory

Během léčby Cimzií

- Pokud se u Vás projeví příznaky zhoubného bujení, vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc.

Srdeční selhání

Před zahájením léčby Cimzií

- Lékař musí u pacientů se srdečním selháním postupovat opatrně. Pokud trpíte středně závažným či závažným srdečním selháním, nesmíte Cimzii užívat.

Během léčby Cimzií

- Pokud se u Vás projeví příznaky srdečního selhání (např. dušnost či otoky nohou), vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Ovlivnění výsledků vyšetření

Termíny léčby Cimzií

Tato kartička obsahuje důležité bezpečnostní informace, které byste měl(a) brát v potaz před zahájením a během léčby Cimzií.

Prosím, přečtěte si příbalovou informaci, která je součástí každého balení Cimzie - obsahuje další bezpečnostní informace.

U pacientů léčených Cimzií bylo pozorováno zkreslení výsledků určitých vyšetření krevní srážlivosti (koagulační vyšetření). Cimzia® může způsobit, že tyto testy chybně indikují prodloužený čas srážlivosti, přestože tomu tak není. Tento jev byl pozorován u testů PTT-LA a STA-PTT A společnosti Diagnostica Stago a u testů HemosIL APTT-SP liquid a HemosIL APTT lyophilised silica společnosti Instrumentation Laboratories. Další aPTT mohou být též ovlivněny.

První injekce:

Následující injekce:

- Přečtěte si příbalovou informaci, kde získáte další informace.
- Ujistěte se, prosím, že při každé návštěvě lékaře u sebe máte seznam všech dalších léků, které užíváte.

Tuto kartičku noste u sebe ještě 5 měsíců po poslední dávce Cimzie, protože nežádoucí účinky se mohou projevit dlouho po podání poslední dávky přípravku.

Datum přípravy: červenec 2009

CI_CR_PM_06_11

Ovlivnění vyšetření trombinového času (TT) a protrombinového času (PT) nebylo pozorováno. Neexistuje důkaz, že by léčba Cimzií měla vliv na srážlivost krve (in vivo koagulace).

Jméno pacienta:

Jméno lékaře:

Telefon na lékaře:

Cimzia®
Kartička pro upozornění pacienta