



PACIENTSKÁ KARTA

Pacient na biologické léčbě revmatoidní artritidy

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

INFORMACE O PACIENTOVI

Jméno _____

Datum první infuze _____

Váha (kg) _____ Dávka (mg) _____

Účinná látka: tocilizumab, 20 mg/ml.

RoActemra je podávána formou infuze každé 4 týdny
Dávka v ampulích (napište počet potřebných ampulí)

Doplňte datum další infuze.

 **RoACTEMRA**[®]
tocilizumab

Tato karta pro pacienta obsahuje důležité informace o bezpečnosti, které musíte vědět před a během užívání přípravku RoActemra.

- Ukažte tuto kartu každému lékaři, který o Vás pečuje.
- Pro více informací čtěte příbalový leták k přípravku RoActemra.

* Mějte s sebou při každé návštěvě lékaře také seznam všech Vašich ostatních léků.

Tuto kartu noste u sebe ještě 3 měsíce po poslední dávce přípravku RoActemra, protože nežádoucí účinky se mohou objevit až za nějakou dobu po poslední dávce.

Kontakt na ošetřujícího lékaře

INFEKCE

RoActemra zvyšuje riziko vzniku infekcí, které mohou být závažné, pokud nejsou léčeny.

- Neměl/a byste být léčen/a přípravkem RoActemra, pokud trpíte závažnou infekcí.
- Před zahájením léčby přípravkem RoActemra byste měl/a být testován/a na tuberkulózu (TBC).
- Řekněte svému lékaři o všech očkováních, která byste mohl/a potřebovat před zahájením léčby přípravkem RoActemra.
- Pokud trpíte jakoukoli infekcí (i třeba jen nachlazením) v době, kdy máte podstoupit další podání infuze, měla by být infuze odložena, dokud se nebudete cítit lépe.
- Pokud se u Vás rozvinou příznaky, jako například horečka, přetrvávající kašel, pokles tělesné hmotnosti, bolest v krku, dušnost, otok a zarudnutí kůže nebo puchýře, závažná slabost nebo únava, vyhledejte okamžitě lékaře. Stejně tak i v případě poranění nebo chirurgického výkonu je potřeba konzultace s ošetřujícím lékařem.

KOMPLIKACE DIVERTIKULÓZNÍHO ONEMOCNĚNÍ

U pacientů užívajících RoActemru se mohou rozvinout komplikace divertikulitidy, které, pokud se neléčí, mohou být závažné.

- Pokud se u vás objeví bolest břicha, kolika, nebo zaznamenáte krev ve stolici, vyhledejte okamžitě lékaře.