

Dávka je vypočtena pomocí následujícího vzorce:

$$\text{hmotnost (kg)} \times \text{jedna dávka (mg/kg)} \times 1 \text{ ml} / 10 \text{ mg}^+ \times 100 \text{ jednotek/1 ml} = \text{počet jednotek}$$

hmotnost
pacienta kg

dávka na injekci mg/kg (dvakrát denně)
0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12

Pro pacienta s hmotností 10 až 40 kg

✿ rozmezí dávek 0,04 mg/kg až 0,12 mg/kg

✿ rozmezí jednotek na stříkačce 4 až 48 jednotek



Místo vpichu injekce by se mělo
s každou dávkou měnit



Increlex® by měl být vždy aplikován
krátce před nebo po jídle

Dávka je vypočtena pomocí následujícího vzorce:

$$\text{hmotnost (kg)} \times \text{jedna dávka (mg/kg)} \times 1 \text{ ml} / 10 \text{ mg}^+ \times 100 \text{ jednotek/1 ml} = \text{počet jednotek}$$

hmotnost
pacienta kg

dávka na injekci mg/kg (dvakrát denně)
0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12

Pro pacienta s hmotností 41 až 70 kg

✿ rozmezí dávek 0,04 mg/kg až 0,12 mg/kg

✿ rozmezí jednotek na stříkačce 17 až 84 jednotek



Místo vpichu injekce by se mělo
s každou dávkou měnit



Increlex® by měl být vždy aplikován
krátce před nebo po jídle

 **increlex®**

Dávkovací karta

Tato karta je pomůckou k přípravě a podání
injekce přípravku Increlex®





Jak používat tento návod

V malém okénku vlevo nastavte hmotnost pacienta. Číslo, které se objeví v pravém okénku pod zvolenou dávkou (mg/kg/2x denně), udává počet jednotek (units) na stříkačce.

Dávka je vypočtena pomocí následujícího vzorce:

**hmotnost (kg) x jedna dávka (mg/kg) x 1 ml/10 mg[†]
x 100 jednotek/1 ml = počet jednotek**

Počáteční dávka Increlexu je 0,04 mg/kg podaných dvakrát denně subkutánní injekcí. Jestliže je tato dávka dobře tolerována nejméně týden, může být zvýšena o 0,04 mg/kg na dávku; maximální dávka je 0,12 mg/kg dvakrát denně.

Hypoglykémie a sledování hladiny glukózy v krvi

Při zahájení léčby by mělo být zváženo sledování glykémie nalačno, dokud není stanovena dobře tolerovaná dávka. Jestliže dojde k častému výskytu příznaků hypoglykémie, mělo by měření glykémie nalačno pokračovat. Jestliže navzdory dostatečnému příjmu potravy dojde v doporučeném rozmezí dávek ke vzniku hypoglykémie, měla by být dávka snížena.

Pro další informace se můžete obrátit na adresu:

Ipsen Pharma
Evropská 136, 160 00 Praha 6
tel.: 242 481 821, fax: 242 481 828
e-mail: info@ipsen.cz
www.ipsen.cz
www.poruchy-rustu.cz