

## Vážená pacientko, vážený paciente,

Lékař Vám zahájil léčbu přípravkem Pradaxa® (dabigatran-etexilát). Pro bezpečné užívání přípravku Pradaxa®, prosím, považujte informace uvedené na této kartě za důležité.

Vzhledem k tomu, že tato karta obsahuje důležité informace o Vaší léčbě, mějte prosím tuto kartu stále u sebe, abyste mohl/a informovat lékaře o užívání přípravku Pradaxa®.

### Další informace můžete získat:

- na telefonním čísle Boehringer Ingelheim **+420 234 655 111**
- na internetové stránce **[www.boehringer-ingelheim.cz](http://www.boehringer-ingelheim.cz)**

**POŽÁDEJTE SVÉHO LÉKAŘE  
O VYPLNĚNÍ ZADNÍ STRANY  
TÉTO KARTY.**



**PRADAXA®**  
**VÝSTRAŽNÁ INFORMAČNÍ  
KARTA PRO PACIENTA**

## Informace pro pacienty o přípravku Pradaxa®

- Při užívání přípravku Pradaxa® dodržujte pokyny svého lékaře
- Přípravek Pradaxa® brání vzniku krevních sraženin tím, že srážení krve zpomaluje. To však může vést ke zvýšení rizika krvácení
- V případě krvácení, které se samo nezastaví, informujte okamžitě svého lékaře
- Protože Pradaxa® působí na systém srážení krve, většina nežádoucích účinků má vztah k příznakům, jako je tvorba podlitin (modřin) či krvácení. Znamky a příznaky krvácení mohou být podlitiny na kůži, tmavá stolice, krev v moči, krvácení z nosu atd.
- Pokud je nutno provést chirurgický nebo jiný výkon, informujte lékaře o tom, že užíváte přípravek Pradaxa®
- Nepřerušujte užívání přípravku Pradaxa® bez rady s lékařem, protože u Vás existuje riziko vzniku cévní mozkové příhody nebo jiné komplikace způsobené tvorbou krevní sraženiny.
- V případě krvácení se poradte s lékařem, než přerušíte užívání přípravku Pradaxa®
- Užívejte přípravek Pradaxa® pravidelně podle pokynů a nevynechávejte dávky

## Informace pro odbornou veřejnost o přípravku Pradaxa®

- Pradaxa® (dabigatran-etexilát) je perorální antikoagulační lék, který je přímým inhibitorem trombinu, a je vylučován převážně ledvinami
- V případě chirurgického nebo jiného invazivního výkonu je třeba ukončit podávání přípravku Pradaxa® s předstihem (podrobnosti viz Souhrn údajů o přípravku)
- V případě závažného krvácení je nutno užívání přípravku Pradaxa® okamžitě ukončit
- Protože přípravek Pradaxa® je vylučován převážně ledvinami, je třeba udržovat odpovídající diurézu. Přípravek Pradaxa® je možno odstraňovat dialýzou, ale existují jen omezené klinické zkušenosti (podrobnosti a další doporučení k odstranění antikoagulačního účinku přípravku Pradaxa® viz Souhrn údajů o přípravku)

## Informace o pacientovi

(Jméno a příjmení pacienta)

(Datum narození)

(Indikace pro antikoagulační léčbu)

(Dávkování přípravku Pradaxa®)

(Kontaktní údaje předepisujícího lékaře)