

ESCAPELLE®

Levonorgestrelum

Edukační materiál pro uživatelku přípravku ESCAPELLE

- 1/ ZPŮSOB POUŽITÍ: Tabletou **užijte co nejdříve, nejpozději však do 72 hodin od nechráněného pohlavního styku!** ESCAPELLE je tím účinnější, čím dříve jej užijete! V případě, že jste v průběhu tří hodin po požití tablety zvracela nebo máte těžký průjem, musíte si zajistit další balení přípravku a co nejdříve užít novou tabletu.
- 2/ PŘÍPRAVEK NEUŽÍVEJTE, pokud již jste těhotná nebo pokud jste měla v minulosti alergickou reakci na levonorgestrel (účinná látka obsažená v ESCAPELLE) nebo na kteroukoli další složku přípravku uvedenou v příbalovém letáku. V takovýchto případech kontaktujte svého gynekologa.
- 3/ NÁVŠTĚVA LÉKAŘE PŘED UŽITÍM ESCAPELLE JE NUTNÁ, pokud
 - je Vám méně než 16 let,
 - užíváte léky, které mohou ovlivnit správný účinek léčiva (např. barbituráty, třezalka tečkovaná, cyklosporin, přípravky k léčbě epilepsie, tuberkulózy, plísňových onemocnění nebo HIV infekce),
 - máte poruchu funkce jater či onemocnění střeva
 - jste v minulosti prodělala mimoděložní těhotenství či zánět vejcovodů. A dále v případě, že od nechráněného pohlavního styku uplynulo již více než 72 hodin nebo máte podezření, že už byste mohla být těhotná.
- 4/ PO UŽITÍ ESCAPELLE se doporučuje používat lokální bariérové metody (prezervativ) až do začátku dalšího menstruačního krvácení. Při dalším nechráněném styku v průběhu stejného menstruačního cyklu Vás ESCAPELLE již nemusí před nechtěným otěhotněním ochránit. Pokud užíváte antikoncepční pilulky, můžete pokračovat v jejich používání, tak jak jste zvyklá.
- 5/ OPAKOVANÉ PODÁNÍ: ESCAPELLE je nouzové kontraceptivum, které by mělo být používáno pouze ve výjimečných situacích. Opakované podání se nedoporučuje. ESCAPELLE je méně účinný než jiné metody dlouhodobé antikoncepce a opakované podání v průběhu jednoho menstruačního cyklu může vést k poruchám cyklu a výskytu s tím spojených nepříjemností. Pokud potřebujete dlouhodobou metodu antikoncepce, obraťte se na svého gynekologa.
- 6/ ESCAPELLE Vás neochrání před sexuálně přenosnými nemocemi, to může zaručit pouze použití kondomu.
- 7/ MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Po použití ESCAPELLE se mohou vyskytnout nevolnosti, napětí v prsou, bolest hlavy, bolest v podbříšku a únava. Tyto nežádoucí účinky ustoupí během několika dní. Do dalšího menstruačního cyklu můžete mít nepravidelné krvácení nebo špinění a i další menstruace může být jiná. Většina žen má následující menstruaci normální a v obvyklém čase, ale některé mají menstruaci později nebo dříve než normálně. Pokud se menstruace o více než 5 dní opozdí nebo je neobvykle slabá nebo naopak neobvykle silná, může se jednat o selhání této metody. V takovém případě a kdykoli, kdy máte podezření, že jste těhotná, kontaktujte neprodleně svého gynekologa.
- 8/ PODEZŘENÍ NA NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY hlase Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků, včetně formuláře pro hlášení naleznete na <http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek>).

Připraveno ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Českou lékárnickou komorou.

Další informace lze získat na adrese:



RICHTER GEDEON

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 141 200, fax: +420 261 141 201
e-mail: richtergedeon@richtergedeon.cz
www.richtergedeon.cz, www.antikoncepce.com

Lékařský informační servis: 261 141 215

PŘED UŽITÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI. Lék pro perorální podání.

Edukační materiál pro uživatelku přípravku POSTINOR-2

- 1/ ZPŮSOB POUŽITÍ: První tabletu **užijte co nejdříve, nejpozději však do 72 hodin od nechráněného pohlavního styku!** POSTINOR-2 je tím účinnější, čím dříve jej užijete. **Druhou tabletu užijte 12 hodin po první tabletě!** V případě, že jste v průběhu tří hodin po požití první nebo druhé tablety zvracela nebo máte těžký průjem, musíte si zajistit další balení přípravku a co nejdříve užít novou tabletu.
- 2/ PŘÍPRAVEK NEUŽÍVEJTE, pokud již jste těhotná nebo pokud jste měla v minulosti alergickou reakci na levonorgestrel (léčivá látka obsažená v POSTINOR-2) nebo na kteroukoli další složku přípravku uvedenou v příbalovém letáku. V takovýchto případech kontaktujte svého gynekologa.
- 3/ NÁVŠTĚVA LÉKAŘE PŘED UŽITÍM POSTINOR-2 JE NUTNÁ, pokud
 - je Vám méně než 16 let,
 - užíváte léky, které mohou ovlivnit správný účinek léčiva (např. barbituráty, třezalka tečkovaná, cyklosporin, přípravky k léčbě epilepsie, tuberkulózy, plísňových onemocnění nebo HIV infekce),
 - máte poruchu funkce jater či onemocnění střeva
 - jste v minulosti prodělala mimoděložní těhotenství či zánět vejcovodů.A dále v případě, že od nechráněného pohlavního styku uplynulo již více než 72 hodin nebo máte podezření, že už byste mohla být těhotná.
- 4/ PO UŽITÍ POSTINOR-2 se doporučuje používat lokální bariérové metody (prezervativ) až do začátku dalšího menstruačního krvácení. Při dalším nechráněném styku v průběhu stejného menstruačního cyklu Vás POSTINOR-2 již nemusí před nechtěným otěhotněním ochránit. Pokud užíváte antikoncepční pilulky, můžete pokračovat v jejich používání tak, jak jste zvyklá.
- 5/ OPAKOVANÉ PODÁNÍ: POSTINOR-2 je nouzové kontraceptivum, které by mělo být používáno pouze ve výjimečných situacích. Opakované podání se nedoporučuje. POSTINOR-2 je méně účinný než jiné metody dlouhodobé antikoncepce a opakované podání v průběhu jednoho menstruačního cyklu může vést k poruchám cyklu a výskytu s tím spojených nepříjemností. Pokud potřebujete dlouhodobou metodu antikoncepce, obraťte se na svého gynekologa.
- 6/ POSTINOR-2 Vás neochrání před sexuálně přenosnými nemocemi, to může zaručit pouze použití kondomu.
- 7/ MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Po použití POSTINOR-2 se mohou vyskytnout nevolnosti, napětí v prsou, bolest hlavy, bolest v podbřišku a únava. Tyto nežádoucí účinky ustoupí během několika dní. Do dalšího menstruačního cyklu můžete mít nepravidelné krvácení nebo špinění a i další menstruace může být jiná. Většina žen má následující menstruaci normální a v obvyklém čase, ale některé mají menstruaci později nebo dříve než normálně. Pokud se menstruace o více než 5 dní opozdí nebo je neobvykle slabá nebo naopak neobvykle silná, může se jednat o selhání této metody. V takovém případě a kdykoli, kdy máte podezření, že jste těhotná, kontaktujte neprodleně svého gynekologa.
- 8/ PODEZŘENÍ NA NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY hlase Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků, včetně formuláře pro hlášení naleznete na <http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek>).

Připraveno ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Českou lékárnickou komorou.



RICHTER GEDEON

Další informace lze získat na adrese:

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 141 200, fax: +420 261 141 201

e-mail: richtergedeon@richtergedeon.cz, www.richtergedeon.cz, www.antikoncepce.com.

Lékařský informační servis: 261 141 215

PŘED UŽITÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI. Lék pro perorální podání.