

AMIODARON MYLAN 200 mg

13/583/11-C

DR: O RP: 13/135/82-C

D: GENERICS [UK] LTD., POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, Velká Británie

S: Amiodaroni hydrochloridum 200 mg

PP: Bílé bikonvexní nepotahované tablety s půlící rýhou, označené AM a 200 na jedné straně a G na straně druhé.

1. PVC/Al blistr, příbalová informace, papírová krabička,
2. Lahvička z polypropylenu s polyethylenovým uzávěrem.

B: POR TBL NOB 10X200MG TBC kód SÚKL: 0165654

POR TBL NOB 20X200MG TBC kód SÚKL: 0165655

POR TBL NOB 28X200MG TBC kód SÚKL: 0165656

POR TBL NOB 30X200MG TBC kód SÚKL: 0165657

POR TBL NOB 50X200MG TBC kód SÚKL: 0165658

POR TBL NOB 60X200MG TBC kód SÚKL: 0165659

POR TBL NOB 90X200MG TBC kód SÚKL: 0165660

POR TBL NOB 10X200MG BLI kód SÚKL: 0165661

POR TBL NOB 20X200MG BLI kód SÚKL: 0165662

POR TBL NOB 28X200MG BLI kód SÚKL: 0165663

POR TBL NOB 30X200MG BLI kód SÚKL: 0165664

POR TBL NOB 50X200MG BLI kód SÚKL: 0165665

POR TBL NOB 60X200MG BLI kód SÚKL: 0165666

POR TBL NOB 90X200MG BLI kód SÚKL: 0165667

IS: Antiarrhythmica

ATC: C01BD01

PE: 24

ZS: Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu (to je pro blistr), uchovávejte lahvičku v krabičce.

ZI: Amiodaron je indikován pouze k léčbě těžkých a/nebo symptomatických poruch rytmu, které neodpovídají na jinou léčbu nebo kde jiná léčba není možná.

Poruchy rytmu spojené s Wolff-Parkinson-Whiteovým syndromem.

Flutter a fibrilace síní.

Všechny typy tachyarytmií paroxysmálního charakteru, včetně: supraventrikulárních, nodálních a ventrikulárních tachykardií, fibrilace komor.

AMLODIPIN ACCORD 10 mg TABLETY

83/571/11-C

DR: O RP: 83/871/92-B/C

D: ACCORD HEALTHCARE LIMITED, NORTH HARROW, MIDDLESEX, Velká Británie

S: Amlodipini besilas 13.9 mg
(odp. Amlodipinum 10 mg)PP: Bílé kulaté bikonvexní tablety o průměru přibližně 8,5mm.
Blistr PVC/PVDC/Al.

B: POR TBL NOB 10X10MG BLI kód SÚKL: 0181132

POR TBL NOB 20X10MG BLI kód SÚKL: 0181133

POR TBL NOB 28X10MG BLI kód SÚKL: 0181134

POR TBL NOB 30X10MG BLI kód SÚKL: 0181135

POR TBL NOB 50X10MG BLI kód SÚKL: 0181136

POR TBL NOB 90X10MG BLI kód SÚKL: 0181137

POR TBL NOB 98X10MG BLI kód SÚKL: 0181138

POR TBL NOB 100X10MG BLI kód SÚKL: 0181139

IS: Vasodilatantia

ATC: C08CA01

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Esenciální hypertenze. Chronická stabilní a vazospastická angina pectoris.

AMLODIPIN ACCORD 5 mg TABLETY

83/570/11-C

DR: O RP: 83/871/92-A/C

D: ACCORD HEALTHCARE LIMITED, NORTH HARROW, MIDDLESEX, Velká Británie

S: Amlodipini besilas 6.95 mg
(odp. Amlodipinum 5 mg)

PP: Bílé, kulaté, bikonvexní tablety, o průměru přibližně 6,6mm.
Blistr PVC/PVDC/Al.

B: POR TBL NOB 10X5MG BLI kód SÚKL: 0181125
POR TBL NOB 20X5MG BLI kód SÚKL: 0181126
POR TBL NOB 28X5MG BLI kód SÚKL: 0181127
POR TBL NOB 30X5MG BLI kód SÚKL: 0181128
POR TBL NOB 50X5MG BLI kód SÚKL: 0181129
POR TBL NOB 98X5MG BLI kód SÚKL: 0181130
POR TBL NOB 100X5MG BLI kód SÚKL: 0181131

IS: Vasodilatantia

ATC: C08CA01

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Esenciální hypertenze. Chronická stabilní a vazospastická angina pectoris.

ESOMEPRAZOL +PHARMA 20 mg ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 09/573/11-C

DR: O RP: 09/077/01-C

D: +PHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, GRAZ, Rakousko

S: Esomeprazolum magnesicum 22.263 mg
(odp. Esomeprazolum 20 mg)

PP: Cihlově červené, kulaté, bikonvexní, potahované tablety s potiskem 20 na jedné straně a hladké na druhé straně.

1. Alu/Alu blistr

2. HDPE lahvička a PP uzávěr s těsněním, nádobka obsahující vysoušedlo - silikagel.

B: POR TBL ENT 7X20MG BLI kód SÚKL: 0166481
POR TBL ENT 10X20MG BLI kód SÚKL: 0166482
POR TBL ENT 14X20MG BLI kód SÚKL: 0166483
POR TBL ENT 20X20MG BLI kód SÚKL: 0166484
POR TBL ENT 28X20MG BLI kód SÚKL: 0166485
POR TBL ENT 30X20MG BLI kód SÚKL: 0166486
POR TBL ENT 50X20MG BLI kód SÚKL: 0166487
POR TBL ENT 56X20MG BLI kód SÚKL: 0166488
POR TBL ENT 60X20MG BLI kód SÚKL: 0166489
POR TBL ENT 90X20MG BLI kód SÚKL: 0166490
POR TBL ENT 100X20MG BLI kód SÚKL: 0166491
POR TBL ENT 7X20MG TBC kód SÚKL: 0166492
POR TBL ENT 10X20MG TBC kód SÚKL: 0166493
POR TBL ENT 14X20MG TBC kód SÚKL: 0166494

POR TBL ENT 20X20MG TBC kód SÚKL: 0166495
POR TBL ENT 28X20MG TBC kód SÚKL: 0166496
POR TBL ENT 30X20MG TBC kód SÚKL: 0166497
POR TBL ENT 50X20MG TBC kód SÚKL: 0166498
POR TBL ENT 56X20MG TBC kód SÚKL: 0166499
POR TBL ENT 60X20MG TBC kód SÚKL: 0166500
POR TBL ENT 90X20MG TBC kód SÚKL: 0166501
POR TBL ENT 100X20MG TBC kód SÚKL: 0166502

IS: Antacida (včetně antiulcerosních léčiv)

ATC: A02BC05

PE: 24

ZS: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

ZI: Dospělí - refluxní choroba jícnu, eradikace H.pylori v kombinaci s antibiotiky, pacienti vyžadující dlouhodobou léčbu nesteroidními antirevmatiky, pokračování po i.v. léčbě prevence opětovného krvácení, léčba Zollinger-Ellisonova syndromu Dospívající od 12 let - refluxní choroba jícnu, eradikace H.pylori v kombinaci s antibiotiky.

ESOMEPRAZOL +PHARMA 40 mg ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 09/574/11-C

DR: O RP: 09/078/01-C

D: +PHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, GRAZ, Rakousko

S: Esomeprazolum magnesicum 44.526 mg
(odp. Esomeprazolum 40 mg)

PP: Cihlově červené, kulaté, bikonvexní, potahované tablety se zkosenými hranami a potiskem 40 na jedné straně.

1.Alu/Alu blistr

2.HDPE lahvička a PP uzávěr s těsněním, nádobka obsahující vysoušedlo - silikagel.

B: POR TBL ENT 7X40MG BLI kód SÚKL: 0166503
POR TBL ENT 10X40MG BLI kód SÚKL: 0166504
POR TBL ENT 14X40MG BLI kód SÚKL: 0166505
POR TBL ENT 20X40MG BLI kód SÚKL: 0166506
POR TBL ENT 28X40MG BLI kód SÚKL: 0166507
POR TBL ENT 30X40MG BLI kód SÚKL: 0166508
POR TBL ENT 50X40MG BLI kód SÚKL: 0166509
POR TBL ENT 56X40MG BLI kód SÚKL: 0166510
POR TBL ENT 60X40MG BLI kód SÚKL: 0166511
POR TBL ENT 90X40MG BLI kód SÚKL: 0166512
POR TBL ENT 100X40MG BLI kód SÚKL: 0166513
POR TBL ENT 7X40MG TBC kód SÚKL: 0166514
POR TBL ENT 10X40MG TBC kód SÚKL: 0166515
POR TBL ENT 14X40MG TBC kód SÚKL: 0166516
POR TBL ENT 20X40MG TBC kód SÚKL: 0166517
POR TBL ENT 28X40MG TBC kód SÚKL: 0166518
POR TBL ENT 30X40MG TBC kód SÚKL: 0166519
POR TBL ENT 50X40MG TBC kód SÚKL: 0166520
POR TBL ENT 56X40MG TBC kód SÚKL: 0166521
POR TBL ENT 60X40MG TBC kód SÚKL: 0166522
POR TBL ENT 90X40MG TBC kód SÚKL: 0166523
POR TBL ENT 100X40MG TBC kód SÚKL: 0166524

IS: Antacida (včetně antiulcerosních léčiv)

ATC: A02BC05

PE: 24

ZS: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

ZI: Dospělí - refluxní choroba jícnu, eradikace H.pylori v kombinaci s antibiotiky, pacienti vyžadující dlouhodobou léčbu nesteroidními antirevmatiky, pokračování po i.v. léčbě prevence opětovného krvácení, léčba Zollinger-Ellisonova syndromu Dospívající od 12 let - refluxní choroba jícnu, eradikace H.pylori v kombinaci s antibiotiky.

FLUOXETINE VITABALANS 20 mg POTAHOVANÉ TABLETY 30/569/11-C

DR: O RP: 30/291/91-C

D: VITABALANS OY, HÄMEENLINNA, Finsko

S: Fluoxetini hydrochloridum 22.36 mg
(odp. Fluoxetinum 20 mg)

PP: Světlezelená kulatá konvexní tableta s půlicí rýhou, průměr 9 mm.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
PVC/Al blistr

B: POR TBL FLM 10X20MG BLI kód SÚKL: 0161629
POR TBL FLM 20X20MG BLI kód SÚKL: 0161630
POR TBL FLM 30X20MG BLI kód SÚKL: 0161631
POR TBL FLM 60X20MG BLI kód SÚKL: 0161632
POR TBL FLM 100X20MG BLI kód SÚKL: 0161633

IS: Antidepressiva

ATC: N06AB03

PE: 48

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Dospělí:

- Depresivní epizody.
- Obsedantně-kompulzivní porucha.
- Mentální bulimie: fluoxetin je indikován jako doplněk k psychoterapii při redukci záchvatovitého přejídání a vyprazdňování.

Děti a dospívající ve věku 8 let a starší:

- Středně těžké až těžké depresivní epizody, jestliže deprese nereaguje po 4 až 6 sezeních na psychoterapii.

Antidepresivní léčba by měla být nabídnuta dětem nebo mladým osobám se středně těžkou až těžkou depresí pouze v kombinaci se současnou psychoterapií.

LEVOMEPROMAZIN ORION 25 mg

68/580/11-C

DR: OE RP: F

D: ORION CORPORATION, ESPOO, Finsko

S: Levomepromazini maleas 33.83 mg
(odp. Levomepromazinum 25 mg)

PP: Bílá až téměř bílá plochá tableta se zkosenými hranami a půlicí rýhou, s označením ORN 16 a průměrem 7 mm. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
HDPE lahev, HDPE závitový uzávěr.

B: POR TBL NOB 30X25MG TBC kód SÚKL: 0138231
POR TBL NOB 100X25MG TBC kód SÚKL: 0138232
POR TBL NOB 50X25MG TBC kód SÚKL: 0186042
POR TBL NOB 84X25MG TBC kód SÚKL: 0186043

IS: Antipsychotica (neuroleptica)

ATC: N05AA02

PE: 24

- ZS: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
- ZI: Schizofrenie a jiné psychózy. Závažná bolest, buď v monoterapii nebo v kombinaci s vhodnými analgetiky.
-

**MEZAVANT 1200 mg ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY S PRODLOUŽENÝM
UVOLŇOVÁNÍM 29/575/11-C**

- DR: S
- D: SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LTD., CHIENAM, BASINGSTOKE,
Velká Británie
- S: Mesalazinum 1200 mg
- PP: Červenohnědé podlouhlé potahované tablety, na jedné straně označené S476.
Polyamid/Al/PVC-Al blistr.
- B: POR TBL ENP 60X1200MG BLI kód SÚKL: 0179014
POR TBL ENP 120X1200MG BLI kód SÚKL: 0179015
- IS: Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica
- ATC: A07EC02
- PE: 24
- ZS: Při teplotě do 25°C v původním obalu.
- ZI: Indukce klinické a endoskopické remise u pacientů s mírnou až středně závažnou aktivní ulcerózní kolitidou. Udržování remise.
-