

## Důležité bezpečnostní informace

Vantas je určen pro paliativní léčbu rakoviny prostaty.

Nepoužívejte Vantas, pokud jste alergický (přecitlivělý) na léčivou látku histrelin acetát.

Materiál rezervoáru (tyčinky), v němž je léčivá látka uložena, obsahuje latex. Informujte svého lékaře, pokud jste na latex alergický.

V průběhu prvního týdne po zavedení implantátu se mohou začít projevovat nové příznaky rakoviny prostaty nebo může dojít ke zhoršení stávajících příznaků. To je při léčbě přípravky podobného typu normální. Váš lékař s Vámi probere možnosti, jak nejnáze překonat toto období. V průběhu zavedení a vyjmutí implantátu můžete pociťovat bolest. Může dojít k zarudnutí nebo vzniku podlitiny v místě aplikace. Tyto reakce bývají obvykle mírné a bez léčby vymizí do 2 týdnů. Pokud během této doby nedojde ke zhojení, kontaktujte svého lékaře.

Dle klinických studií jsou nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Vantas návaly horka, nevolnost, kožní reakce v místě zavedení implantátu, zmenšení varlat a zhoršená činnost ledvin.

Podobně jako u jiné hormonálně supresivní léčby, může i Vantas u některých pacientů způsobit bolest prsní žlázy nebo impotenci.

Dlouhodobá léčba přípravkem Vantas může zvyšovat riziko ztráty kostní hmoty a může způsobit řídnutí kostí (osteoporózu) a zvýšit riziko zlomenin kostí. Navíc se u pacientů mohou objevit metabolické změny (např. glukózová intolerance nebo zhoršení cukrovky (již existujícího diabetu)). Pacienti s vysokým rizikem metabolického nebo kardiovaskulárního onemocnění by měli být pečlivě sledováni.

*Toto není úplný přehled možných nežádoucích účinků. Pro více informací čtěte příbalovou informaci nebo kontaktujte svého lékaře.*

**VANTAS**<sup>®</sup>  
(histrelin implant)

Orion Oyj, organizační složka  
Orion Pharma  
Zelený pruh 95/97  
140 00 Praha 4  
www.orionpharma.cz



## Karta pro pacienta

Tato karta Vám pomůže zapamatovat si pokyny, které Vám Váš lékař dal po zavedení implantátu Vantas. Předkládá lékař pacientovi po preskripci přípravku.

# Váš nový implantát Vantas

## Sjednejte si kontroly u lékaře včas

I když jste obdrželi celoroční léčbu v jedné aplikaci, měli byste být s Vaším lékařem v pravidelném kontaktu. Váš lékař/sestra mohou tuto kartu používat pro zaznamenání data vyjmutí Vašeho implantátu (léčba implantátem je určena přesně na jeden rok po zavedení) a pravidelných kontrol (vykonání laboratorních testů, prodiskutování Vaší léčby). Karta může sloužit i pro zaznamenání Vašich otázek, které chcete s lékařem probrat.

## Pooperační péče

Pečlivě si přečtěte následující body, jak pečovat po zavedení implantátu o Vaši paži.

Nechte obvaz na paži po dobu alespoň jednoho dne. Po dobu 24 hodin po zavedení implantátu paži s implantátem udržujte čistou a suchou, neplavte, nekoupejte se.

Po 24 hodinách můžete obvaz odstranit.

Neškrábejte, ani se nedotýkejte rány.

Dávejte pozor, abyste se několik dní do rány neuhodili. Ulehčí to proces hojení.

Neodstraňujte chirurgické sterilní stripy. Sterilní stripy jsou elastické náplasti - proužky. Lékař je použil k uzavření rány po zavedení implantátu. Stripy musí odpadnout samy.

Nezvedejte těžké předměty a neprovodujte namáhavé fyzické aktivity ošetřenou paží po dobu 7 dnů po zavedení implantátu.

**V případě dotazů  
ohledně implantátu  
Vantas kontaktujte  
svého lékaře**

**Datum zavedení:**

**Jméno lékaře:**

**Telefonní číslo lékaře:**

**Data pravidelných kontrol:**

- |    |    |
|----|----|
| 1. | 5. |
| 2. | 6. |
| 3. | 7. |
| 4. | 8. |

**Poznámky/dotazy pro lékaře/sestru:**

**Termín vyjmutí ( a/nebo zavedení nového implantátu):**