

AMBROXOL EUPHAR 30 mg TABLETY

52/235/12-C

DR: L

D: EUPHAR S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Ambroxoli hydrochloridum 30 mg

PP: Bílá kulatá tableta.

Průsvitný PVC-PVDC/ALU blistr

B: POR TBL NOB 20X30MG BLI kód SÚKL: 0157605

IS: Expectorantia, mucolytica

ATC: R05CB06

PE: 36

ZS: Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

P: Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.

ZI: Mukolytická léčba (napomáhající odkašlávání) akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu.

COLUDA 37,5 mg/325 mg

65/220/12-C

DR: O RP: 65/237/02-C

D: SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT, PARIS, Francie

S: Paracetamolum 325 mg

Tramadoli hydrochloridum 37.5 mg

PP: Světle žlutá podlouhlá bikonvexní potahovaná tableta

PVC-PVdC/Al blistry

B: POR TBL FLM 2 BLI kód SÚKL: 0182288

POR TBL FLM 10 BLI kód SÚKL: 0182289

POR TBL FLM 20 BLI kód SÚKL: 0182290

POR TBL FLM 30 BLI kód SÚKL: 0182291

POR TBL FLM 40 BLI kód SÚKL: 0182292

POR TBL FLM 50 BLI kód SÚKL: 0182293

POR TBL FLM 60 BLI kód SÚKL: 0182294

POR TBL FLM 70 BLI kód SÚKL: 0182295

POR TBL FLM 80 BLI kód SÚKL: 0182296

POR TBL FLM 90 BLI kód SÚKL: 0182297

POR TBL FLM 100 BLI kód SÚKL: 0182298

IS: Analgetica - anodyna

ATC: N02AX52

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání

ZI: Symptomatická léčba středně silných až silných bolestí u dospělých pacientů a dospívajících od 12 let. Použití přípravku COLUDA by mělo být vyhrazeno pro pacienty se středně silnými až silnými bolestmi, které se nezmírňují podáváním periferních analgetik a vyžadují kombinaci tramadol- hydrochloridu a paracetamolu .

DELIPID 10 mg

31/229/12-C

DR: O RP: 31/314/03-C

D: INTERNIS PHARMACEUTICALS LIMITED, EDINBURGH, Velká Británie

S: Rosuvastatinum zincicum 10.68 mg

(odp. Rosuvastatinum 10 mg)

PP: Bílé nebo téměř bílé, kulaté, mírně bikonvexní potahované tablety se stylizovaným E na jedné straně a kódem 592 na druhé straně.

OPA/Al/PVC//Al blistr
B: POR TBL FLM 28X10MG BLI kód SÚKL: 0170281
POR TBL FLM 56X10MG BLI kód SÚKL: 0170282
POR TBL FLM 70X10MG BLI kód SÚKL: 0170283
POR TBL FLM 84X10MG BLI kód SÚKL: 0170284
POR TBL FLM 98X10MG BLI kód SÚKL: 0170285
IS: Hypolipidaemica
ATC: C10AA07
PE: 30
ZS: Přípravek je třeba uchovávat při teplotě do 30 °C v původním obalu z důvodu ochrany před světlem.
ZI: Léčba hypercholesterolémie a prevence kardiovaskulárních příhod.

DELIPID 20 mg 31/230/12-C
DR: O RP: 31/315/03-C
D: INTERNIS PHARMACEUTICALS LIMITED, EDINBURGH, Velká Británie
S: Rosuvastatinum zincicum 21.36 mg
(odp. Rosuvastatinum 20 mg)
PP: Bílé nebo téměř bílé, kulaté, mírně bikonvexní potahované tablety se stylizovaným E a pod ním kódem 593 na jedné straně.
OPA/Al/PVC//Al blistr
B: POR TBL FLM 28X20MG BLI kód SÚKL: 0170286
POR TBL FLM 56X20MG BLI kód SÚKL: 0170287
POR TBL FLM 70X20MG BLI kód SÚKL: 0170288
POR TBL FLM 84X20MG BLI kód SÚKL: 0170289
POR TBL FLM 98X20MG BLI kód SÚKL: 0170290
IS: Hypolipidaemica
ATC: C10AA07
PE: 30
ZS: Přípravek je třeba uchovávat při teplotě do 30 °C v původním obalu z důvodu ochrany před světlem.
ZI: Léčba hypercholesterolémie a prevence kardiovaskulárních příhod.

DELIPID 40 mg 31/231/12-C
DR: O RP: 31/316/03-C
D: INTERNIS PHARMACEUTICALS LIMITED, EDINBURGH, Velká Británie
S: Rosuvastatinum zincicum 42.72 mg
(odp. Rosuvastatinum 40 mg)
PP: Bílé nebo téměř bílé, kulaté, mírně bikonvexní potahované tablety se stylizovaným kódem E 594 na jedné straně.
OPA/Al/PVC//Al blistr
B: POR TBL FLM 28X40MG BLI kód SÚKL: 0170291
POR TBL FLM 56X40MG BLI kód SÚKL: 0170292
POR TBL FLM 70X40MG BLI kód SÚKL: 0170293
POR TBL FLM 84X40MG BLI kód SÚKL: 0170294
POR TBL FLM 98X40MG BLI kód SÚKL: 0170295
IS: Hypolipidaemica
ATC: C10AA07
PE: 30
ZS: Přípravek je třeba uchovávat při teplotě do 30 °C v původním obalu z důvodu ochrany

před světlem.

ZI: Léčba hypercholesterolémie a prevence kardiovaskulárních příhod.

DELIPID 5 mg

31/228/12-C

DR: O RP: 31/472/10-C

D: INTERNIS PHARMACEUTICALS LIMITED, EDINBURGH, Velká Británie

S: Rosuvastatinum zincicum 5.34 mg
(odp. Rosuvastatinum 5 mg)

PP: Bílé nebo téměř bílé, kulaté, mírně bikonvexní potahované tablety se stylizovaným E na jedné straně a kódem 591 na druhé straně.

OPA/Al/PVC//Al blistr

B: POR TBL FLM 28X5MG BLI kód SÚKL: 0170276

POR TBL FLM 56X5MG BLI kód SÚKL: 0170277

POR TBL FLM 70X5MG BLI kód SÚKL: 0170278

POR TBL FLM 84X5MG BLI kód SÚKL: 0170279

POR TBL FLM 98X5MG BLI kód SÚKL: 0170280

IS: Hypolipidaemica

ATC: C10AA07

PE: 30

ZS: Přípravek je třeba uchovávat při teplotě do 30 °C v původním obalu z důvodu ochrany před světlem.

ZI: Léčba hypercholesterolémie a prevence kardiovaskulárních příhod.

DIABEZIDUM 30 mg

18/227/12-C

DR: O RP: 18/469/00-C

D: JELFA S.A., JELENIA GÓRA, Polsko

S: Gliclazidum 30 mg

PP: Bílé tablety, 4.5 x 10.1 mm, oválné, bikonvexní, s vyraženým značením "G" na jedné straně.

1. Al/průhledný PVDC-PVC blistr, blistry balené v krabičce

2. Bílá HDPE lahvička s bílým LDPE těsnícím bezpečnostním uzávěrem

B: POR TBL PRO 60X30MG BLI kód SÚKL: 0158825

POR TBL PRO 60X30MG TBC kód SÚKL: 0158826

IS: Antidiabetica (včetně insulinu)

ATC: A10BB09

PE: 12

ZS: Blistry:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C av původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí (blistry v krabičce).

HDPE lahvička:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu. Uchovávejte tablety v dobře uzavřené lahvičce.

ZI: Léčba diabetu mellitu 2. typu.

LEFLUGEN 100 mg

29/217/12-C

DR: OC RP: 99/118/009-EU1

D: GENERICS [UK] LTD., POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, Velká Británie

S: Leflunomidum 100 mg

PP: Bílé podlouhlé, bikonvexní potahované tablety o rozměrech 19,4 x 7,8 mm s půlící rýhou na jedné straně.

Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky

Papírová krabička s PA/ALU/PVC - (Alu/Alu) blistry nebo PA/ALU/PVC - (Alu/Alu) perforovanými jednodávkovými blistry.

B: POR TBL FLM 3X100MG I BLI kód SÚKL: 0159986

POR TBL FLM 3X100MG II BLI kód SÚKL: 0191958

IS: Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica

ATC: L04AA13

PE: 36

ZS: Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba dospělých pacientů s aktivní revmatoidní artritidou a aktivní psoriatickou artritidou (DMARD).

LEFLUGEN 20 mg

29/216/12-C

DR: OC RP: 99/118/005-EU1

D: GENERICS [UK] LTD., POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, Velká Británie

S: Leflunomidum 20 mg

PP: Žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru 8,1 mm s půlící rýhou na jedné straně.

Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Papírová krabička s PA/ALU/PVC - (Alu/Alu) blistry nebo PA/ALU/PVC - Alu/Alu perforovanými jednodávkovými blistry nebo s bílou neprůhlednou HDPE lahvičkou s pojistným uzávěrem se zabudovaným vysoušedlem (silikagel) nebo se sáčky vysoušedla.

B: POR TBL FLM 30X20MG I BLI kód SÚKL: 0159982

POR TBL FLM 30X20MG TBC kód SÚKL: 0159983

POR TBL FLM 100X20MG TBC kód SÚKL: 0159984

POR TBL FLM 100X20MG I BLI kód SÚKL: 0159985

POR TBL FLM 30X20MG II BLI kód SÚKL: 0191955

POR TBL FLM 100X20MG II BLI kód SÚKL: 0191956

POR TBL FLM 500X20MG TBC kód SÚKL: 0191957

IS: Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica

ATC: L04AA13

PE: 36

ZS: Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba dospělých pacientů s aktivní revmatoidní artritidou a aktivní psoriatickou artritidou (DMARD).

LEVOCETIRIZIN GLENMARK 5 mg

24/137/12-C

DR: O RP: 24/050/02-C

D: GLENMARK GENERICS (EUROPE) LIMITED, KENTON, HARROW, Velká Británie

S: Levocetirizini dihydrochloridum 5 mg

PP: Bílé oválné bikonvexní potahované tablety, s vyraženým značením "G" nad i pod půlící rýhou na jedné straně a hladké na druhé straně.

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Blistry Al/Al nebo PVC/PVdC-Al.

B: POR TBL FLM 10X5MG I BLI kód SÚKL: 0145446

POR TBL FLM 20X5MG I BLI kód SÚKL: 0145447

POR TBL FLM 21X5MG I BLI kód SÚKL: 0145448
POR TBL FLM 28X5MG I BLI kód SÚKL: 0145449
POR TBL FLM 30X5MG I BLI kód SÚKL: 0145450
POR TBL FLM 50X5MG I BLI kód SÚKL: 0145451
POR TBL FLM 90X5MG I BLI kód SÚKL: 0145452
POR TBL FLM 10X5MG II BLI kód SÚKL: 0145453
POR TBL FLM 20X5MG II BLI kód SÚKL: 0145454
POR TBL FLM 21X5MG II BLI kód SÚKL: 0145455
POR TBL FLM 28X5MG II BLI kód SÚKL: 0145456
POR TBL FLM 30X5MG II BLI kód SÚKL: 0145457
POR TBL FLM 50X5MG II BLI kód SÚKL: 0145458
POR TBL FLM 90X5MG II BLI kód SÚKL: 0145459

IS: Antihistaminica, histamin

ATC: R06AE09

PE: 30

ZS: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

P: Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.

ZI: Symptomatická léčba chronické idiopatické urtikárie.

LISPECIP 15 mg TABLETY

18/224/12-C

DR: OC RP: 00/150/001-EU1

D: SPECIFAR S.A., ATHENS, Řecko

S: Pioglitazoni hydrochloridum 16.534 mg
(odp. Pioglitazonum 15 mg)

PP: Bílé, kulaté, ploché tablety s vyraženou číslicí "15" na jedné straně, o průměru asi 5,5 mm.

PA/Al/PVC/Al blistry

B: POR TBL NOB 14X15MG BLI kód SÚKL: 0175899
POR TBL NOB 28X15MG BLI kód SÚKL: 0175900
POR TBL NOB 30X15MG BLI kód SÚKL: 0175901
POR TBL NOB 50X15MG BLI kód SÚKL: 0175902
POR TBL NOB 56X15MG BLI kód SÚKL: 0175903
POR TBL NOB 90X15MG BLI kód SÚKL: 0175904
POR TBL NOB 98X15MG BLI kód SÚKL: 0175905

IS: Antidiabetica (včetně insulinu)

ATC: A10BG03

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba diabetes mellitus II. typu.

LISPECIP 30 mg TABLETY

18/225/12-C

DR: OC RP: 00/150/004-EU1

D: SPECIFAR S.A., ATHENS, Řecko

S: Pioglitazoni hydrochloridum 33.069 mg
(odp. Pioglitazonum 30 mg)

PP: Bílé, kulaté, ploché tablety s půlicí rýhou na jedné straně a s vyraženou číslicí "30" na druhé straně, o průměru asi 7,0 mm. Tabletou lze dělit na dvě stejné poloviny.

PA/Al/PVC/Al blistry

B: POR TBL NOB 14X30MG BLI kód SÚKL: 0175906
POR TBL NOB 28X30MG BLI kód SÚKL: 0175907

POR TBL NOB 30X30MG BLI kód SÚKL: 0175908
POR TBL NOB 50X30MG BLI kód SÚKL: 0175909
POR TBL NOB 56X30MG BLI kód SÚKL: 0175910
POR TBL NOB 90X30MG BLI kód SÚKL: 0175911
POR TBL NOB 98X30MG BLI kód SÚKL: 0175912

IS: Antidiabetica (včetně insulinu)

ATC: A10BG03

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání

ZI: Léčba diabetes mellitus II. typu.

LISPECIP 45 mg TABLETY

18/226/12-C

DR: OC RP: 00/150/011-EU1

D: SPECIFAR S.A., ATHENS, Řecko

S: Pioglitazoni hydrochloridum 49.604 mg
(odp. Pioglitazonum 45 mg)

PP: Bílé, kulaté, ploché tablety s vyraženou číslicí "45" na jedné straně, o průměru asi 8,0 mm.

PA/Al/PVC/Al blistry

B: POR TBL NOB 14X45MG BLI kód SÚKL: 0175913

POR TBL NOB 28X45MG BLI kód SÚKL: 0175914

POR TBL NOB 30X45MG BLI kód SÚKL: 0175915

POR TBL NOB 50X45MG BLI kód SÚKL: 0175916

POR TBL NOB 56X45MG BLI kód SÚKL: 0175917

POR TBL NOB 90X45MG BLI kód SÚKL: 0175918

POR TBL NOB 98X45MG BLI kód SÚKL: 0175919

IS: Antidiabetica (včetně insulinu)

ATC: A10BG03

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání

ZI: Léčba diabetes mellitus II. typu.

MEDRACET 37,5 mg/325 mg

65/218/12-C

DR: O RP: 65/237/02-C

D: PHARMASWISS ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Paracetamolum 325 mg
Tramadoli hydrochloridum 37.5 mg

PP: Téměř bílé kulaté tablety s půlicí rýhou, o průměru 12 mm.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky

Blistr (průhledný PVC/PVdC/Al), krabička

B: POR TBL NOB 10 BLI kód SÚKL: 0178513

POR TBL NOB 20 BLI kód SÚKL: 0178514

POR TBL NOB 30 BLI kód SÚKL: 0178515

POR TBL NOB 40 BLI kód SÚKL: 0178516

POR TBL NOB 50 BLI kód SÚKL: 0178517

POR TBL NOB 60 BLI kód SÚKL: 0178518

IS: Analgetica - anodyna

ATC: N02AX52

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: Medracet 37,5 mg/325 mg je určen k symptomatické léčbě bolesti střední až silné intenzity. Použití přípravku Medracet 37,5 mg/325 by mělo být vyhrazeno pro pacienty, u nichž léčba bolesti střední až silné intenzity vyžaduje kombinaci tramadolu a paracetamolu.

MOKATEL 10 mg POTAHOVANÉ TABLETY

14/205/12-C

DR: O RP: 14/351/99-C

D: GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Montelukastum natricum 10.4 mg
(odp. Montelukastum 10 mg)

PP: Běžová, kulatá, bikonvexní, potahovaná tableta o průměru 8 mm s vyraženým "G" na jedné straně a "392" na straně druhé
HDPE lahvička s polypropylenovým bezpečnostním uzávěrem, obsahující nádobku se silikagelovým vysoušedlem, papírová krabička

B: POR TBL FLM 30X10MG TBC kód SÚKL: 0153015
POR TBL FLM 28X10MG TBC kód SÚKL: 0153018
POR TBL FLM 20X10MG TBC kód SÚKL: 0153019

IS: Bronchodilatantia, antiasthmatica

ATC: R03DC03

PE: 36

ZS: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Po otevření spotřebujte do 30 dnů.

ZI: Indikován k léčbě astmatu jako doplňková léčba u pacientů s mírným až středně těžkým přetrvávajícím astmatem - indikován k profylaxi astmatu, pokud je rozhodující složkou bronchokonstrikce indukovaná tělesnou námahou.

MOKATEL 4 mg ŽVÝKACÍ TABLETY

14/203/12-C

DR: O RP: 14/350/99-C

D: GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Montelukastum natricum 4.2 mg
(odp. Montelukastum 4 mg)

PP: Bílá až téměř bílá, oválná, bikonvexní nepotahovaná tableta o rozměrech 11 x 7,8 mm s vyraženým "G" na jedné straně a "390" na straně druhé
HDPE lahvička s polypropylenovým bezpečnostním uzávěrem, obsahující nádobku se silikagelovým vysoušedlem, papírová krabička

B: POR TBL MND 30X4MG TBC kód SÚKL: 0153020
POR TBL MND 28X4MG TBC kód SÚKL: 0153022
POR TBL MND 20X4MG TBC kód SÚKL: 0153023

IS: Bronchodilatantia, antiasthmatica

ATC: R03DC03

PE: 36

ZS: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Po otevření spotřebujte do 30 dnů.

ZI: Indikován k léčbě astmatu jako doplňková léčba u pacientů ve věku 2 až 5 let s mírným až středně těžkým přetrvávajícím astmatem - alternativní léčba k inhalačním kortikosteroidům v nízkých dávkách u pacientů ve věku od 2 do 5 let - indikován k profylaxi astmatu pro pacienty od 2 let a starších, kde je převládající složkou námahou

indukovaná bronchokonstrikce.

MOKATEL 5 mg ŽVÝKACÍ TABLETY

14/204/12-C

DR: O RP: 14/350/99-C

D: GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Montelukastum natricum 5.2 mg
(odp. Montelukastum 5 mg)

PP: Bílá až téměř bílá, bikonvexní nepotahovaná kulatá tableta o průměru 9,5 mm s
vyraženým "G" na jedné straně a "391" na straně druhé
HDPE lahvička s polypropylenovým bezpečnostním uzávěrem, obsahující nádobku se
silikagelovým vysoušedlem, papírová krabička

B: POR TBL MND 30X5MG TBC kód SÚKL: 0153024

POR TBL MND 28X5MG TBC kód SÚKL: 0153026

POR TBL MND 20X5MG TBC kód SÚKL: 0153027

IS: Bronchodilantia, antiasthmatica

ATC: R03DC03

PE: 36

ZS: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Po otevření
spotřebujte do 30 dnů.

ZI: Indikován k léčbě astmatu jako doplňková léčba u pacientů s mírným až středně těžkým
přetrvávajícím astmatem - alternativní léčba k inhalačním kortikosteroidům v nízkých
dávkách u pacientů s mírným přetrvávajícím astmatem bez závažných astmatických
záchvatů - indikován k profylaxi astmatu, kde je převládající složkou námahou
indukovaná bronchokonstrikce.

TRACETA 37,5 mg/325 mg TABLETY

65/222/12-C

DR: O RP: 65/237/02-C

D: PRO.MED.CS PRAHA A.S., PRAHA, Česká republika

S: Paracetamolum 325 mg
Tramadoli hydrochloridum 37.5 mg

PP: Téměř bílé kulaté tablety s půlicí rýhou, o průměru 12 mm
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení
na stejné dávky

Blistr průhledný PVC/PVdC/Al), krabička

B: POR TBL NOB 10 BLI kód SÚKL: 0178519

POR TBL NOB 20 BLI kód SÚKL: 0178520

POR TBL NOB 30 BLI kód SÚKL: 0178521

POR TBL NOB 40 BLI kód SÚKL: 0178522

POR TBL NOB 50 BLI kód SÚKL: 0178523

POR TBL NOB 60 BLI kód SÚKL: 0178524

IS: Analgetica - anodyna

ATC: N02AX52

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Symptomatická léčba bolesti střední až silné intenzity. Použití přípravku Traceta 37,5
mg/325 mg by mělo být vyhrazeno pro pacienty, u nichž léčba bolesti střední až silné
intenzity vyžaduje kombinaci paracetamolu s tramadolem.
