

Tato kartička obsahuje důležité bezpečnostní informace, které byste měl(a) brát v potaz před zahájením a během léčby Cimzií.

Prosím, přečtěte si příbalovou informaci, která je součástí každého balení Cimzie - obsahuje další bezpečnostní informace.

CI_C_PM_14d_12

Ovlivnění výsledků vyšetření

Pacienti by měli informovat svého lékaře, jestliže jsou léčeni protisrážlivými léky a zda byl u nich proveden test na srážlivost krve.

U pacientů léčených Cimzií bylo pozorováno zkreslení výsledků určitých vyšetření krevní srážlivosti (koagulační vyšetření). Cimzia® může způsobit, že tyto testy chybně indikují prodloužený čas srážlivosti, přestože tomu tak není. Tento jev byl pozorován u testů PTT-LA a STA-PTT A společnosti Diagnostica Stago a u testů HemosIL APTT-SP liquid a HemosIL APTT lyophilised silica společnosti Instrumentation Laboratories. Další aPTT mohou být též ovlivněny. Ovlivnění vyšetření trombinového času (TT) a protrombinového času (PT) nebylo pozorováno. Neexistuje důkaz, že by léčba Cimzií měla vliv na srážlivost krve (*in vivo* koagulace).

Každý lékař ošetřující pacienta léčeného přípravkem Cimzia by měl pro podrobnější informace vyhledat SPC tohoto léčivého přípravku.



UCB s.r.o., Palác Karlín
Thámova 11-13, 186 00 Praha 8
tel.: +420 221 773 411, fax: +420 224 829 152
e-mail: info.prague@ucb.com

Termíny léčby Cimzií

První injekce: _____

Následující injekce: _____

- Přečtěte si příbalovou informaci, kde získáte další informace.
- Ujistěte se, prosím, že při každé návštěvě lékaře u sebe máte seznam všech dalších léků, které užíváte.

Jméno pacienta: _____

Jméno lékaře: _____

Telefon na lékaře: _____

Tuto kartičku noste u sebe ještě 5 měsíců po poslední dávce Cimzie, protože nežádoucí účinky se mohou projevit dlouho po podání poslední dávky přípravku.

CIMZIA®

KARTIČKA
S UPOZORNĚNÍM
PRO PACIENTA

Tuto kartičku mějte neustále u sebe a ukažte ji každému lékaři, který Vás bude léčit.

Infekce

Cimzia zvyšuje riziko vzniku infekcí. Infekce se mohou mnohem rychleji zhoršovat a mohou mít závažnější průběh. Toto zahrnuje i tuberkulózu (TBC).

Před zahájením léčby Cimzií:

- Cimzií nesmíte být léčen(a), pokud trpíte závažnou infekcí.
- Měli byste být vyšetřeni na infekci virovou hepatitidou B. Jestliže jste přenašeč hepatitidy B, měli byste být pečlivě sledováni na projevy a příznaky aktivní hepatitidy. Léčba Cimzií musí být přerušena u pacientů s aktivní virovou hepatitidou B.
- Měl(a) byste být vyšetřen(a) na TBC. Je velmi důležité, abyste svého lékaře informoval(a), že jste prodělal(a) TBC nebo jste byl(a) v blízkém kontaktu s osobou/osobami trpícími TBC.

Prosím, uveďte datum Vašeho posledního vyšetření na TBC:

Tuberkulinový test: _____

RTG hrudníku: _____

Během léčby Cimzií:

- Pokud se u Vás projeví příznaky naznačující infekci, jako je horečka, přetrvávající kašel, úbytek hmotnosti či netečnost (apatie), vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Použití Cimzie nebo jiných blokátorů TNF může zvýšit riziko rakoviny. Jestliže se u Vás objeví nevysvětlitelné otoky nebo trpíte zvýšeným pocením, zejména v noci, nebo nějakými jinými příznaky uvedenými výše k infekcím, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Tyto příznaky však nemusí znamenat rakovinu.

Očkování pacientů

- Živé vakcíny nesmějí být podávány současně s Cimzií.

Pacienti před chirurgickými zákroky

- Před chirurgickým zákrokem musí být pacienti, kterým je podávána Cimzie, pečlivě monitorováni na výskyt infekce a musí být přijata příslušná opatření.

Srdeční selhání

Před zahájením léčby Cimzií:

- Lékař musí u pacientů se srdečním selháním postupovat opatrně. Pokud trpíte středně závažným či závažným srdečním selháním, nesmíte Cimzii užívat.

Během léčby Cimzií:

- Pokud se u Vás projeví příznaky srdečního selhání (např. dušnost či otoky nohou), vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.