

- Ukažte tuto kartu každému lékaři, který se podílí na Vaší léčbě, nejen svému neurologovi.
- Před zahájením léčby prosím čtěte pozorně příbalovou informaci TYSABRI pro pacienta (PIL).
- Tuto kartu si ponechejte u sebe po dobu 6 měsíců od poslední dávky TYSABRI, neboť nežádoucí účinky se mohou vyskytnout i po ukončení léčby TYSABRI.

Jméno pacienta:

Jméno a telefon lékaře:

Datum zahájení léčby TYSABRI:

## KARTA PACIENTA



Biogen Idec (Czech Republic), s.r.o.  
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4  
tel.: +420 255 706 200  
fax: +420 255 706 229  
www.biogenidec.cz

TY00-CZE-0008 říjen 2012



EVERY  
4-WEEKS  
**TYSABRI**<sup>®</sup>  
(natalizumab)

## Tato karta obsahuje důležité bezpečnostní informace, které musíte znát předtím, než budete užívat TYSABRI, a během léčby TYSABRI.

### Před léčbou TYSABRI

- Přípravkem TYSABRI byste neměli být léčeni, máte-li závažný problém se svým imunitním systémem.
- Užíváte-li TYSABRI, neměli byste dlouhodobě užívat žádné jiné léky na roztroušenou sklerózu.

### Během léčby TYSABRI

PML (progresivní multifokální leukoencefalopatie) je vzácné infekční onemocnění mozku, které se vyskytuje u pacientů léčených TYSABRI. PML způsobuje těžké postižení a může být smrtelná. Riziko PML se zvyšuje s délkou léčby, zvláště nad 2 roky, předchozí léčbou imunosupresivy a přítomností protilátek proti JC viru v krvi.

- Příznaky PML mohou být podobné relapsu RS (např. slabost nebo zrakové potíže). Proto pokud jste přesvědčení o tom, že se Vaše RS zhoršuje nebo zaznamenáte-li jakékoliv nové příznaky, je velmi důležité, abyste to co nejdříve oznámili svému lékaři. Znamky PML se zpravidla objevují pomaleji než příznaky spojené s RS (dny až týdny) a mohou připomínat příznaky RS.

#### Příznaky PML:

- změny a poruchy koncentrace
- změny chování
- slabost jedné poloviny těla
- zrakové obtíže
- nové neurologické příznaky, které jsou pro Vás neobvyklé

Zvládnutí PML vyžaduje odstranění nebo vyloučení TYSABRI z krve, obvykle výměnou krevní plazmy.

U pacientů s PML se během dnů až několika týdnů po léčbě PML (a odstranění TYSABRI) může pravděpodobně dostavit těžká zánětlivá reakce známá jako IRIS. IRIS může vést k různým příznakům včetně zhoršení neurologických funkcí.

- Ukažte tuto kartu svému partnerovi nebo ošetřovateli. Mohou si povšimnout příznaků PML, které si sám/sama možná neuvědomujete, např. změny v náladě a chování, výpadky paměti, poruchy řeči nebo potíže v komunikaci.

Při užívání TYSABRI se mohou vyskytnout závažné infekce. Obráťte se na svého lékaře a ukažte mu tuto kartu a příbalovou informaci, jakmile se domníváte, že máte těžkou přetrvávající infekci, např. neustupující horečku.