



KARTA PRO PACIENTA

s jiným než onkologickým onemocněním
léčeného přípravkem MabThera®

Údaje o léčbě přípravkem MABTHERA®:

První dávka:

Poslední dávka:

Jméno pacienta: _____

Jméno lékaře: _____

Telefon lékaře: _____

- Více údajů naleznete v příbalové informaci pro přípravek MabThera®.
- Mějte s sebou při každé návštěvě lékaře také seznam všech ostatních léků, které užíváte.

Jméno _____

Tato karta pro pacienta obsahuje důležité bezpečnostní informace, které byste měl/a znát před zahájením léčby přípravkem MabThera® a v průběhu léčby přípravkem MabThera®.

- Ukažte tuto kartu každému lékaři, který Vás léčí, nejen svému ošetřujícímu specialistovi.

MABTHERA®
RITUXIMAB

INFEKCE

MabThera[®] může zvyšovat riziko vzniku infekcí.

Před zahájením léčby přípravkem MABTHERA[®]

- Neměl(a) byste být léčen(a) přípravkem MabThera[®], pokud trpíte závažnou infekcí nebo máte závažné problémy s imunitním systémem.
- Upozorněte svého lékaře, pokud užíváte nebo jste v minulosti užíval/a léky, jako je chemoterapie nebo imunosupresiva, které by mohly ovlivnit Váš imunitní systém.

V průběhu nebo po ukončení léčby přípravkem MABTHERA[®]

- Pokud se u Vás rozvinou příznaky připomínající infekce, jako je například horečka, přetrvávající kašel, úbytek hmotnosti nebo apatie, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

- U některých pacientů užívajících MabTheru se velmi vzácně objevila závažná mozková infekce nazývaná progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), která vedla k úmrtí.
- Příznaky PML zahrnují ztrátu paměti, poruchy myšlení, problémy s chůzí a/nebo ztrátu vidění. **V případě, že zaznamenáte kterýkoliv z těchto příznaků, informujte okamžitě svého lékaře.**

VZHLEDEM K TOMU, ŽE OSLABENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU ZPŮSOBENÉ PŘÍPRAVKEM MABTHERA[®] MŮŽE PŘETRVÁVAT PO DOBU NĚKOLIKA MĚSÍCŮ, MŮŽE DOJÍT K PROJEVŮM NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ I PŘESTO, ŽE LÉČBA BYLA UKONČENA. Z TOHOTO DŮVODU NOSTE, PROSÍM, TUTO KARTU U SEBE PO DOBU 24 MĚSÍCŮ PO POSLEDNÍ DÁVCE PŘÍPRAVKU MABTHERA[®].