# Deník bolesti

Záznamová karta

# Záznamová karta přípravku Effentora®

100/200/400 mikrogramů
4/28 bukálních tablet

| Pravidelně užívané léky na bolest | | | Intenzita bolesti 1-10 | |
|---|---|---|---|---|
| Název léku | Datum | Denní doba | Před lékem | Po léku |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Škála intenzity bolesti od 0 (žádná) do 10 (nejhorší bolest)**

Žádná bolest — Nejhorší bolest

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

| Aplikovaná dávka Effentora® 100/200/400 µg **– datum/čas/síla** | Činnost, při které se průlomová bolest objevila | Místo bolesti na těle | Opakovaná dávka ano/ne; **Pokud ano: čas** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Veďte si, prosím, záznam o tom, kdy a kolik tablet přípravku Effentora® jste použil(a). Pomůže to Vám i Vašemu lékaři ověřit správnost léčby.

Pokud Vám zbývají 4 a méně tablet, obraťte se, prosím, bez prodlení na Vašeho ošetřujícího lékaře tak, aby byla i nadále zajištěna dostatečná kontrola Vaší průlomové bolesti.

Je důležité, abyste používali přípravek Effentora® k léčbě maximálně 4 příhod průlomové bolesti denně. Jednotlivé příhody průlomové bolesti by neměly být léčeny více než 2 tabletami, které užijete po 30 minutách a pouze v případě, že první tableta nevedla k dostatečné úlevě bolesti.