

BELARA

17/101/02-C/PI/003/13

D: GEDEON RICHTER PLC., BUDAPEŠŤ, Maďarsko
S: Chlormadinoni acetat 2 mg
(odp. Chlormadinonum 1.79 mg)
Ethinylestradiolum 0.03 mg
PP: Kulaté, světle růžové bikonvexní potahované tablety
PVC/PVDC/Al blistr, nálepka s překladem zkratk dnů v týdnu, krabička
B: POR TBL FLM 3X21 BLI kód SÚKL: 0132692
IS: Anticoncipientia
ATC:G03AA15
PE: 36
ZS: Uchovávejte při teplotě do 30°C.
ZI: Hormonální
antikoncepce.
Léčba středně těžké papulopustulózní formy akné u žen, u
kterých je indikován ethinylestradiol/chlormadinon-acetát jako
hormonální antikoncepce.

BIOPAROX

15/833/92-S/C/PI/001/14

D: LES LABORATOIRES SERVIER, SURESNES CEDEX, Francie
S: Fusafunginum 50 mg
PP: Žlutý roztok charakteristického zápachu
Tlaková hliníková nádobka s 25 µl odměrným ventilem, obsahující 10 ml roztoku
odpovídající 400 odměřeným dávkám, se třemi polyethylenovými nástavci: jeden ústní
nástavec (bílý), dva nosní nástavce (žlutý pro dospělé a průhledný pro děti), krabička.
B: NAS+ORM SPR SOL 10ML/400DÁV PSS kód SÚKL: 0132784
IS: Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím)
ATC:R02AB03
PE: 24
ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nevystavujte
teplotám vyšším než 50 °C.
Nádobku nepropichujte a nevhazujte do ohně
P: Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.
ZI: Bioparox se používá k lokální léčbě zánětů a infekcí sliznice hltanu a dýchacích cest -
při rinitidě, sinusitidě, rinofaryngitidě, laryngitidě, faryngitidě, tonzilitidě, stavech po
tonzilektomii, tracheitidě, bronchitidě.
Bioparox je indikován k léčbě dětí starších 30 měsíců a dospělých.

CERAZETTE

17/273/03-C/PI/001/14

D: N.V. ORGANON, OSS, Nizozemsko
S: Desogestrelum 0.075 mg
PP: Tableta je bílá, kulatá, bikonvexní, potahovaná měřicí 5 mm. Na jedné straně je
označena kódem KV nad číslicí 2 a na druhé straně po svém obvodu nápisem Organon
PVC/Al blistr zatavený do hliníkového sáčku, kartička s českými zkratkami názvů dnů
v týdnu, krabička
B: POR TBL FLM 84X75RG BLI kód SÚKL: 0132785
IS: Anticoncipientia
ATC:G03AC09
PE: 36
ZS: Uchovávejte při teplotě 2 °C - 30 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem a vlhkostí.

ZI: Kontracepce.

DAYLETTE 3 mg/0,02 mg POTAHOVANÉ TABLETY 17/070/11-C/PI/001/14

D: GEDEON RICHTER PLC., BUDAPEŠŤ, Maďarsko

S: Drospirenonum 3 mg

Ethinylestradiolum 0.02 mg

PP: Aktivní tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, průměr 6 mm. Na jedné straně vyraženo "G73", na druhé straně hladké.

Placebo tablety jsou zelené, kulaté, bikonvexní potahované tablety, průměr 6 mm, obě strany hladké.

PVC/PE/PVDC-Al blistry. Blistry jsou baleny papírových krabičkách s příbalovou informací a v každé krabičce je etui pouzdro.

B: POR TBL FLM 3X28 BLI kód SÚKL: 0132750

IS: Anticoncipientia

ATC:G03AA12

PE: 24

ZS: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

ZI: Perorální kontracepce.

DIANE-35

17/154/84-C/PI/001/14

D: BAYER PHARMA AG, BERLÍN, Německo

S: Ethinylestradiolum 0.035 mg

Cyproteroni acetat 2 mg

PP: Běžové obalené tablety

Al/PVC blistr s kalendářním označením, krabička

B: POR TBL OBD 3X21 BLI kód SÚKL: 0132745

IS: Anticoncipientia

ATC:G03HB01

PE: 36

ZS: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

ZI: Léčba středně závažné až závažné akné související s citlivostí k androgenům (se seboroou nebo bez ní) a/nebo hirsutismem u žen v plodném věku.

Přípravek Diane-35 smí být používán k léčbě akné pouze po neúspěchu lokální léčby nebo systémové léčby antibiotiky.

Protože přípravek Diane-35 účinkuje také jako perorální kontraceptivum, neměl by být používán v kombinaci s jinou hormonální antikoncepcí (viz bod 4.3).

FROMILID 500

15/422/99-C/PI/001/13

D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, NOVO MESTO, Slovinsko

S: Clarithromycinum 500 mg

PP: Žluté, oválné, bikonvexní, potahované tablety.

Al/ PVC/PVDC blistr, krabička.

B: POR TBL FLM 14X500MG BLI kód SÚKL: 0132734

IS: Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím)

ATC:J01FA09

PE: 60

ZS: Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

ZI: Klarithromycin je indikován k léčbě infekcí vyvolaných citlivými organismy. Mezi tyto infekce patří:

- infekce horních cest dýchacích (tonzilofaryngitida, otitis media, akutní sinusitida),
- infekce dolních cest dýchacích (akutní bakteriální bronchitida, akutní exacerbace chronické bronchitidy, komunitně získaná pneumonie a atypická pneumonie),
- infekce kůže a měkkých tkání,
- infekce vyvolané mykobakteriemi (*Mycobacterium avium* komplex, *Mycobacterium kansasii*, *Mycobacterium marinum*, *Mycobacterium leprae*) a prevence rozšíření těchto infekcí u pacientů s AIDS,
- eradikace *Helicobacter pylori* u pacientů s žaludečním nebo duodenálním vředem (vždy v kombinaci s jinými léky).

Přípravek Fromilid potahované tablety je určen pro dospělé a děti starší než 12 let.

Je nutné dbát oficiálně vydaných doporučení ohledně správného užívání antibakteriálních látek.
