

AZALIA 75 MIKROGRAMŮ POTAHOVANÉ TABLETY 17/570/07-C/PI/001/14

D: KABU PHARMA S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Desogestrelum 0.075 mg

PP: Bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní, potahovaná tableta o průměru asi 6 mm.

Na jedné straně je vyraženo "D", na druhé straně "75".

Al/PVC/PVDC blistr, kartonové pouzdro, krabička

B: POR TBL FLM 3X28X75MCG BLI kód SÚKL: 0132823

IS: Anticoncipientia

ATC: G03AC09

PE: 24

ZS: Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

ZI: Kontracepce.

BONEFOS 800 mg

44/291/99-C/PI/001/14

DR: O

D: VMT UNION, S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Dinatrii clodronas tetrahydricus 1000 mg
(odp. Dinatrii clodronas 800 mg)

PP: Bílé oválné potahované tablety, na jedné straně půlicí rýha a kód L 134.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

PVC/Al blistr dělitelný po jedné dávce, krabička

B: POR TBL FLM 60X800MG BLI kód SÚKL: 0132805

IS: Cytostatica

ATC: M05BA02

PE: 36

ZS: Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

ZI: Léčba hyperkalcemie způsobené maligním onemocněním.

Léčba osteolýzy způsobené maligním onemocněním.

BONEFOS 800 mg

44/291/99-C/PI/002/14

DR: O

D: KABU PHARMA S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Dinatrii clodronas tetrahydricus 1000 mg
(odp. Dinatrii clodronas 800 mg)

PP: Bílé oválné potahované tablety, na jedné straně půlicí rýha a kód L 134.

(Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.)

PVC/Al blistr dělitelný po jedné dávce, krabička

B: POR TBL FLM 60X800MG BLI kód SÚKL: 0132822

IS: Cytostatica

ATC: M05BA02

PE: 36

ZS: Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

ZI: Léčba hyperkalcemie způsobené maligním onemocněním.

Léčba osteolýzy způsobené maligním onemocněním.

CITALEC 20 ZENTIVA

30/553/05-C/PI/002/14

D: GLUCOPHARMA S.R.O., PRAHA 9, Česká republika

S: Citaloprami hydrobromidum 24.98 mg
(odp. Citalopramum 20 mg)
PP: Kulaté, bílé až téměř bílé, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou, o průměru 8 mm, výška 3,0 - 3,4 mm. Tabletů lze rozdělit na dvě stejné dávky.
Neprůhledný, bílý, PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička.
B: POR TBL FLM 30X20MG BLI kód SÚKL: 0132807
IS: Antidepressiva
ATC: N06AB04
PE: 24
ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: Léčba
. depresivních epizod nebo preventivně proti potenciálnímu opětovnému zhoršení zdravotního stavu či recidivám.
. panické poruchy s agorafobií nebo bez ní.
. obsedantně-kompulzivní poruchy.

DETRALEX

85/392/91-C/PI/001/14

D: GLUCOPHARMA S.R.O., PRAHA 9, Česká republika
S: Flavonoidorum fractio purificata micronisata 500 mg
(odp. Diosminum 450 mg)
Hesperidinum 50 mg
PP: Oválné, potahované, bikonvexní tablety lososové barvy se zkosenými hranami.
Al/PVC blistr, krabička
B: POR TBL FLM 60X500MG BLI kód SÚKL: 0132786
IS: Venopharmaca, antivaricosa
ATC: C05CA53
PE: 48
ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: Léčba příznaků a projevů chronické žilní insuficience dolních končetin, funkčních nebo organických:
- pocit tíhy,
- bolest,
- noční křeče,
- edém,
- trofické změny, včetně bércevého vředu.
Léčba akutní ataky hemoroidálního onemocnění, základní léčba subjektivních příznaků a funkčních objektivních projevů hemoroidálního onemocnění.
Přípravek je určen dospělým pacientům.

MINESSE POTAHOVANÉ TABLETY

17/123/00-C/PI/001/14

DR: S
D: PHARMEDEX S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: Gestodenum 0.06 mg
Ethinylestradiolum 0.015 mg
PP: Potahované tablety s léčivou látkou jsou světle žluté, kulaté, bikonvexní, na jedné straně mají vyraženo "60", na druhé straně mají vyraženo "15".
Potahované tablety bez léčivé látky jsou bílé, kulaté, bikonvexní, bez dalšího označení.
PVC/Al blistr, krabička

B: POR TBL FLM 3X28 BLI kód SÚKL: 0132717

IS: Anticoncipientia

ATC:G03AA10

PE: 34

ZS: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Prevence otěhotnění. Rozhodnutí předepsat přípravek Minesse by mělo být provedeno po zvážení jednotlivých současných rizikových faktorů ženy, zvláště rizikových faktorů pro žilní tromboembolismus (VTE), a toho, jaké je riziko VTE u přípravku Minesse v porovnání s dalšími přípravky CHC (kombinovaná hormonální antikoncepce) (viz body 4.3 a 4.4).

POSTINOR-2

17/834/99-C/PI/001/14

D: GLUCOPHARMA S.R.O., PRAHA 9, Česká republika

S: Levonorgestrelum 0.75 mg

PP: Téměř bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo "INOR". PVC//Al blistr. Jeden blistr obsahuje 2 tablety. Blistr je zabalený v papírové krabičce.

B: POR TBL NOB 2X0.75MG BLI kód SÚKL: 0132787

IS: Anticoncipientia

ATC:G03AD01

PE: 60

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

P: Léčivý přípravek lze vydat bez lékařského předpisu s omezením.

ZI: Nouzové kontraceptivum pro použití do 72 hodin po nechráněném sexuálním styku nebo po selhání použité metody kontracepce.

SEVORANE

05/384/97-C/PI/001/14

D: AARA PHARM S.R.O., OSTRAVA, Česká republika

S: Sevofluranum 250 ml

PP: čirý bezbarvý roztok

Hnědá PEN láhev s uzávěrem Quick-Fil nebo hnědá PEN láhev s uzávěrem ROPP, papírová krabička

B: INH SOL 1X250ML LAG kód SÚKL: 0132814

IS: Anaesthetica (celková)

ATC:N01AB08

PE: 36

ZS: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

ZI: SEVORANE lze užít k úvodu do celkové anestezie i k jejímu dalšímu vedení u dětí i u dospělých.

Lze jej používat jak u hospitalizovaných nemocných, tak při anestezii u ambulantně prováděných výkonů.

TIAPRIDAL

68/171/85-C/PI/001/14

D: PHARMEDEX S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Tiapridi hydrochloridum 111.1 mg
(Tiapridum 100 mg)

PP: Téměř bílé, kulaté, ploché tablety, na jedné straně dělicí kříž, na druhé vyražený nápis "T 100", Tablety lze dělit na čtyři stejné dávky.

PVC/Al blistr, krabička

B: PO TBL NOB 50X100MG BLI kód SÚKL: 0132673

IS: Antipsychotica (neuroleptica)

ATC: N05AL03

PE: 36

ZS: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Dospělí:

- krátkodobá léčba poruch chování ve stáří nebo při chronickém abusu alkoholu
- těžká chorea při Huntingtonově chorobě
- těžké tikové poruchy včetně Gilles de la Touretteovy choroby, pokud nefarmakologická léčba není dostatečná

Děti od 6 let a dospívající:

- těžké tikové poruchy včetně Gilles de la Touretteovy choroby, pokud nefarmakologická léčba není dostatečná
 - těžké poruchy chování s agitovaností a agresivitou.
-