

Karta pacienta - Ruconest®

Prosím, vždy ukažte tuto kartu ošetřujícímu zdravotnickému pracovníkovi.

Ruconest® (konestat alfa)

Riziko hypersenzitivní reakce na stopy králičích proteinů - opatření pro používání

Tomuto pacientovi byl za účelem léčby akutních záchvatů vrozeného angioedému předepsán přípravek Ruconest®. Ruconest je rekombinantní lidský inhibitor C1 esterázy purifikovaný z mléka transgenních králíků a obsahující stopy králičích bílkovin. Před zahájením léčby tohoto pacienta přípravkem Ruconest® vyhodnoťte minulost a aktuální anamnézu a zaměřte se na alergii na králíky. Pokud je alergie na králíky prokázána nebo na ní existuje podezření, je nutné zvážit jiné možnosti léčby nekráličího původu.

Vždy zkontrolujte, zda v průběhu posledního roku pacient podstoupil vyšetření na přítomnost IgE protilátek proti králíkům (srsti) s negativním výsledkem.

Vyšetření IgE protilátek proti králíkům (srsti) je třeba opakovat jednou ročně nebo po 10 podáních, podle toho, co nastane jako první. Vyšetření IgE protilátek má být dále zopakováno, pokud se objeví příznaky alergie na králíky.

Při léčbě tohoto pacienta vždy dodržujte následující postup:

1. Sledujte, zda pacient nevykazuje klinické známky a příznaky hypersenzitivity.
2. V případech anafylaktické reakce nebo šoku okamžitě poskytněte lékařskou pomoc.
3. Informujte pacienta o obvyklých známkách hypersenzitivní reakce, např. kopřivka, generalizovaná kopřivka, pocit tíže na hrudi, dušnost (sípání), hypotenze a anafylaxe, i o tom, že pokud se některý z těchto příznaků objeví, musí ukončit užívání přípravku Ruconest a ihned upozornit zdravotnického pracovníka. Vysvětlete pacientovi rozdíl mezi hypersenzitivní reakcí a záchvatem vrozeného angioedému.
4. Opakovaně pacientovi připomínejte, aby okamžitě hlásil jakékoli alergické reakce na králíky.
5. Požádejte pacienta, aby tuto kartu měl vždy u sebe a ukazoval ji zdravotnickému pracovníkovi, který bude jeho akutní záchvaty vrozeného angioedému léčit.
6. Hlašte veškerá podezření na hypersensitivitu/nepříznivé imunologické reakce.

Další informace získáte prostudováním Edukačních materiálů a Souhrnu údajů o přípravku nebo kontaktováním lokálního zástupce Ruconest® na telefonním čísle: +420 257 222 034, +421 2 5939 6165 nebo prostřednictvím cee-medinfo@sobi.com.

Strana 2

Trpím vrozeným angioedémem (HAE)

Jméno pacienta _____

Rodné číslo _____

Hmotnost _____

Můj specialista nebo centrum zabývající se HAE:

Jméno _____

Telefon _____

Vyšetření na IgE protilátky proti králíkům (srsti)

Datum	Výsledky vyšetření

Aplikace přípravku Ruconest

Pořadí aplikace	Datum	Dávka
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		

18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Byl u mě diagnostikován vrozený angioedém (HAE), který se manifestuje opakovanými otoky způsobenými nedostatkem endogenního inhibitoru C1 esterázy. Když nebudu správně léčen, záchvaty vrozeného angioedému mohou závažně ohrozit mé zdraví, pokud se otoky objeví v místech, jako je orofarynx nebo hrtan.

Přípravek Ruconest obdržím pouze, pokud nemám alergii na králíky a neexistuje na ni ani podezření.

Ruconest

Pokud se domníváte, že se u vás rozvinula alergie na králíky, ihned kontaktujte lékaře. Další informace získáte prostudováním příbalové informace.