

Kontrolní seznam 2: Kontrolní seznam pro sledování probíhající terapie metylfenidátem

Datum posouzení:	
Důvod posouzení:	
Jméno pacienta:	
Datum narození:	
Věk:	Pohlaví:

Pečlivě zkontrolujte následující systémy **při každé úpravě dávky** a při návazných návštěvách **alespoň každých 6 měsíců**. V návaznosti na provedené vyhodnocení použijte tabulku „Přehled pro průběžné sledování léčby metylfenidátem“ pro zaznamenání informací požadovaných pro průběžné sledování. *

	Vyhodnocení
Obecné zdravotní nálezy	Údaje doplňte do připojeného přehledu*
• Zdokumentujte výšku, tělesnou hmotnost a chuť k jídlu	☐
Zvažte ukončení podávání MPH, je-li růst nižší než očekávání	
• Zdokumentujte jakýkoliv náznak zneužívání, nesprávného užívání nebo odchýlení od doporučeného režimu užívání	☐
• Těhotenství	☐
Přehodnoťte přínosy a rizika podávání MPH	
Nové kardiovaskulární nálezy	Hodnotu TK a SF doplňte do připojeného přehledu*
• Palpitace	☐
• Bolest na hrudi při námaze	☐
• Nevysvětlená synkopa	☐
• Dyspnoe	☐
• Další příznaky indikující srdeční onemocnění	☐
Odešlete na okamžité kardiologické vyšetření	
Nové neurologické nálezy	
• Silné bolesti hlavy, pocit necitlivosti, slabost či paralýza, porucha koordinace, zraku, řeči, jazyka či paměti	☐
Jakékoliv z výše uvedených stavů mohou indikovat cerebrální vaskulitidu: přestaňte podávat MPH	
• Zvýšení frekvence záchvatů nebo nový nástup záchvatů	☐
Je nutno ukončit podávání MPH	

		Vyhodnocení
Nové psychiatrické nálezy nebo jejich zhoršení	Sledujte rozvoj nových nebo zhoršení předcházejících psychiatrických poruch	
• Psychotické nebo manické příznaky		☐
Zvažte ukončení podávání MPH		
• Sebevražedné myšlenky nebo chování		☐
Zvažte léčbu základního psychiatrického onemocnění		
Přehodnoťte přínosy a rizika podávání MPH		
Zvažte ukončení podávání MPH		
• Agresivní nebo nepřátelské chování		☐
Zvažte potřebu úpravy léčby		
• Úzkost, agitovanost nebo napětí		☐
• Depresivní příznaky		☐
• Pohybové nebo verbální tiky nebo jejich zhoršení		☐
Doba trvání léčby		
• Pacient je léčen kontinuálně po dobu delší než 12 měsíců		☐
• Je upozorováno zlepšení příznaků po odpovídající úpravě dávkování v průběhu 1 měsíce, jinak se doporučuje ukončení podávání léku		☐
Zvažte zkušební období bez podávání léků alespoň jednou za rok, abyste mohli stanovit, zda je ještě nutno pokračovat v léčbě		

Ukončení léčby

Během doby vysazení léku se požaduje pečlivý lékařský dohled, neboť tento krok může vést k odhalení:

- Depresí
- Chronické nadměrné aktivity

Někteří pacienti mohou vyžadovat dlouhodobou návaznou péči.

Zde zaznamenejte všechny doplňující informace