

VPMD

Váš průvodce léčbou poškození zraku způsobeného vlhkou (neovaskulární) formou věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) přípravkem Lucentis® (ranibizumab)

Tato brožura Vám pomůže lépe pochopit léčbu vlhké (neovaskulární) formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) přípravkem Lucentis®

Co je přípravek Lucentis®?

- Přípravek Lucentis® patří do skupiny léčiv označovaných jako léky ovlivňující vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF).
- Přípravek Lucentis® zabraňuje VEGF-A, látce ovlivňující patologickou novotvorbu cév, způsobovat další poškození oka a může dokonce i napravit část již existujícího poškození.

Jak se přípravek Lucentis® podává?

- Přípravek Lucentis® se podává formou injekce do oka.
 - Je normální mít z injekce obavy, ale většina pacientů uvádí, že injekce je bezbolestná.

Co se bude dít při mé návštěvě lékaře?

V den léčby se Váš lékař ujistí, že jste v pohodě a relaxovaná/ý.

- Lékař nebo sestra:
 - Zakryjí Váš obličej a oblast kolem oka speciální rouškou.
 - Očistí Vaše oko a kůži kolem něj.
 - Podrží Vaše oko otevřené tak, abyste nemrkal/a.
 - Znecitliví oko pomocí anestetika, aby zabránili bolesti.
- Lékař Vám poté do bělma oka aplikuje injekci. Můžete při injekci cítit určitý malý tlak.
- Je důležité informovat lékaře, pokud:
 - Máte infekci oka.
 - Máte bolest nebo zarudnutí oka.
 - Se domníváte, že můžete mít alergii na Lucentis® nebo na přípravek Betadine® (jód).

Co se bude dít po podání injekce přípravku Lucentis®?

Váš lékař Vás vyšetří, včetně změření nitroočního tlaku v oku, aby se ujistil, že je všechno v pořádku.

- Bělo o oka, kam byla podána injekce, bude pravděpodobně zarudlé.
 - Toto zarudnutí je normální a během několika dní zmizí.
 - Kontaktujte lékaře, pokud se nezlepší nebo se zhorší.
- V zorném poli můžete pozorovat skvrny nebo plovoucí částice.
 - Tyto skvrny jsou normální a během několika dní by měly zmizet.
 - Kontaktujte lékaře, pokud se stav nezlepší nebo se zhorší nebo před okem vidíte zvýšený počet malých částic.
- Vaše zornice bude před podáním injekce rozšířena, což Vám může na několik hodin po léčbě zhoršit zrak.
 - Neřidte, dokud se Váš zrak nevrátí do normálního stavu.

Je důležité sledovat změny stavu oka a těla v týdnu následujícím po injekci.

- Vzácně může injekce způsobit infekci oka.
- Kontaktujte svého lékaře okamžitě, pokud se v oku objeví kterýkoliv z těchto příznaků: bolest, citlivost na světlo/slzení, otok víčka nebo jiný otok, výraznější zarudnutí, rozmazané nebo zkreslené vidění, ztráta zraku, záblesky světla, černé tečky nebo barevné kruhy, suchost oka.
- Svého lékaře také kontaktujte co nejdříve, pokud zpozorujete kterýkoliv z těchto příznaků: náhlá bolest nebo otok svalů, bolest hlavy, točení hlavy, dušnost, kašel, nevolnost, zvracení, pocení, svědění, vyrážka, otok rtu nebo obličeje, kulhání, které se objevuje a mizí, teplo/bolestivost lýtky, necitlivost a bolest kůže, horních nebo dolních končetin, krvácení z nosu, krev v moči, tvorba modřin, setřelá řeč, slabost nebo paralýza svalů (obzvláště na jedné straně)

Jak dlouho trvá léčba přípravkem Lucentis®?

Každý pacient je jiný. V závislosti na změnách zraku budete možná potřebovat pokračování léčby přípravkem Lucentis®.

- Promluvte si se svým lékařem o výsledcích vyšetření a o svých pocitech z léčby.
- Pokud se Váš zrak nezlepší okamžitě, je důležité dále chodit na plánované návštěvy.
 - Nejlepší způsob, jak si udržet nezávislost a zrak, je navštěvovat lékaře pravidelně.
 - Nezapomeňte s lékařem probrat všechny možnosti léčby.

Vždy se dostavte na plánovanou návštěvu, na kterou Vás lékař objednal.


Protože Vaše choroba vyžaduje pravidelnou léčbu, budou zapotřebí častá vyšetření.

Oddíl 2 – Vlhká (neovaskulární) forma VPMD

Co je to VPMD a jak ovlivňuje můj zrak?

Vlhká forma VPMD je choroba postihující žlutou skvrnu (makulu), což je část sítnice v zadní části oka.

- Žlutá skvrna nám umožňuje vidět ostře v centru zrakového pole



National Eye Institute, National Institutes of Health

Oddíl 3 – Poškození zraku způsobeného v důsledku VPMD

Jedním z faktorů přispívajících k rozvoji vlhké formy VPMD je látka zvaná vaskulární endoteliální růstový faktor A (VEGF–A), která vede k tvorbě nových cév, které propouští tekutinu do žluté skvrny a zhoršují tak zrak.



Může se stát, že ztráta zraku způsobená vlhkou formou VPMD již začala ovlivňovat Vaši schopnost provádět každodenní úkony, jako je čtení, nakupování nebo řízení.

- Většina pacientů potřebuje pravidelné návštěvy lékaře za účelem vyšetření a léčby.

Co mohu očekávat po léčbě přípravkem Lucentis®?

- Při léčbě přípravkem Lucentis® můžete očekávat zlepšení zrakové ostrosti a s tím související zlepšení každodenních aktivit, jako je čtení, nakupování a řízení.

Oddíl 3 – Poškození zraku způsobeného v důsledku VPMD

Co můžu udělat pro léčbu poškození zraku způsobeného choroidální neovaskularizací v důsledku VPMD?

Pravidelně sledujte svůj zrak.

- Zapisujte si změny zraku.
- Buďte iniciativní a informujte lékaře nebo sestru, pokud zpozorujete nějakou změnu.
- Vyrovnat se se změnou zraku může být obtížné – je zcela v pořádku požádat o pomoc.
 - Promluvte si s rodinou a s přáteli o svém zraku a řekněte jim, pokud máte potíže se čtením, orientací, užíváním léků nebo domácími pracemi.
 - Pokud nemáte rodinu nebo přátele, kteří by Vám mohli pomoci, poraďte se s lékařem o možnostech ošetrovatelských služeb.

- Upravte svůj životní styl.
 - Měl/a byste jíst vyváženou stravu, protože je dobrá pro celkové zdraví organismu a je dobrá i pro Vaše oči.
 - Snažte se jíst více listové zeleniny a ryb.
- Poradte se s lékařem o potravinových doplncích pro zlepšení zraku.
- Pokud kouříte, pokuste se přestat.
 - Kouření může poškodit Váš zrak.
- Sluneční světlo může poškodit Vaše oči, noste sluneční brýle, pokud půjdete ven na prudké slunce.

Váš průvodce léčbou poškození zraku

Než se začnete léčit přípravkem Lucentis®, přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci nebo požádejte někoho, aby Vám ji celou přečetl.

Případné nežádoucí účinky konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo další otázky vztahující se k léčbě, prosím, obraťte se na Vašeho ošetřujícího lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.

Podrobnosti o hlášení najdete na: <http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek>.

Adresa pro zaslání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz.

Lucentis® je biologický léčivý přípravek. V hlášení je proto nutné uvést jeho přesný obchodní název (Lucentis®) a číslo šarže.

Tato informace může být také hlášena společnosti Novartis na adresu:

Novartis s.r.o., Gemini, budova B,
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4

tel: 800 40 40 50

fax: 225 775 205

email: farmakovigilance.cz@novartis.com

CZ1706656057/06/2017