

## ANTIKONCEPCE

Používáte v současné době nějakou antikoncepci?

ANO       NE

Pokud ano, napište sem její název:

.....  
.....  
.....

Veďte s sebou tuto kartu při další návštěvě lékaře nebo gynekologa a ten Vám poradí ohledně potřeby další nebo alternativní metody antikoncepce.

## PŘIPOMÍNKOVÁ KARTA PACIENTA

### **Důležitá bezpečnostní upozornění pro pacienty užívající přípravek Bosentan Mylan (bosentan)**

Tato karta obsahuje důležité informace o přípravku Bosentan Mylan. Přečtěte si prosím tuto kartu pečlivě, než začnete léčbu přípravkem Bosentan Mylan.

Vaše jméno:

.....  
.....

Předepisující lékař:

.....

Pokud máte otázky k přípravku Bosentan Mylan, zeptejte se svého lékaře.

***Pokud jste pacientka v plodném věku, přečtěte si pečlivě tuto stránku.***

### **TĚHOTENSTVÍ**

- Přípravek Bosentan Mylan může narušit vývoj plodu. Proto nesmíte přípravek Bosentan Mylan užívat, pokud jste těhotná, a rovněž nesmíte během užívání přípravku Bosentan Mylan otěhotnět.
- Navíc, pokud se léčíte na plicní hypertenzi, může otěhotnění závažně zhoršit příznaky choroby. Pokud máte podezření, že byste mohla být těhotná, sdělte to svému lékaři nebo gynekologovi.

### **ANTIKONCEPCE**

- **Hormonální antikoncepce** – jako je perorální antikoncepce neboli antikoncepční pilulky, hormonální injekce, implantáty nebo antikoncepční náplasti u žen, které užívají přípravek Bosentan Mylan těhotenství spolehlivě nezabrání. Je třeba, abyste vedle kteréhokoli typu hormonální antikoncepce užívala bariérovou metodu antikoncepce - jako je kondom, pesar nebo vaginální houba. Nezapomeňte probrat se svým lékařem nebo gynekologem všechny otázky, které Vás napadnou - podrobnosti vypište na zadní stranu této karty a vezměte ji s sebou při další návštěvě lékaře nebo gynekologa.

Předtím, než začnete užívat přípravek Bosentan Mylan, a poté každý měsíc během léčby si musíte udělat těhotenský test, i když si myslíte, že nejste těhotná.

Datum prvního testu:

.....

### **KREVNÍ TEST JATERNÍCH FUNKCÍ**

U některých pacientů užívajících Bosentan Mylan byly zjištěny abnormální výsledky testů jaterních funkcí. Během léčby přípravkem Bosentan Mylan Váš lékař zařídí pravidelné krevní testy s cílem zjistit změny jaterních funkcí.

**Nezapomeňte si nechat udělat krevní test jaterních funkcí každý měsíc.**

**Po zvýšení dávky se po 2 týdnech provede další test.**

Datum prvního testu:

.....

Rozpis krevních testů jaterních funkcí

<input type="checkbox"/> Leden	<input type="checkbox"/> Květen	<input type="checkbox"/> Září
<input type="checkbox"/> Únor	<input type="checkbox"/> Červen	<input type="checkbox"/> Říjen
<input type="checkbox"/> Březen	<input type="checkbox"/> Červenec	<input type="checkbox"/> Listopad
<input type="checkbox"/> Duben	<input type="checkbox"/> Srpen	<input type="checkbox"/> Prosinec