

## EDUKAČNÍ MATERIÁLY

Ujistěte se, že jste vybral(a) správnou lékovou formu a sílu přípravku MabThera®

### SUBKUTÁNNÍ INJEKCE

MabThera 1400 mg  
POUZE PRO POUŽITÍ U NHL\*



Růžové  
odlamovací víčko

MabThera 1600 mg  
POUZE PRO POUŽITÍ U CLL\*



Modré  
odlamovací víčko

Odeberte přímo z injekční lahvičky  
a podávejte subkutánní injekcí



Před použitím zkontrolujte specifické charakteristiky balení přípravku MabThera: Červený štítek: „**Pouze k subkutánnímu podání**“, „**roztok pro subkutánní injekci**“ a „s.c.“

### INTRAVENÓZNÍ INFUZE

MabThera 100 mg koncentrát pro infuzní roztok  
MabThera 500 mg koncentrát pro infuzní roztok  
Pro použití u všech schválených indikací  
přípravku MabThera\*



**Naředte 0,9% roztokem NaCl  
nebo 5% roztokem glukózy  
a podávejte intravenózní infuzí**

\* NHL = ne Hodgkinův lymfom.

\* CLL = chronická lymfocytární leukémie

Přípravek MabThera s.c. není indikován jako monoterapie u pacientů s folikulárním lymfomem ve stadiu III-IV, kteří jsou rezistentní k chemoterapii nebo prodlávají druhy nebo další následný relaps po chemoterapii.

Máte-li jakékoli další otázky, nahlédněte do Souhrnu údajů o přípravku nebo kontaktujte společnost Roche s.r.o., Futurama Business Park Bld F, Sokolovská 685/136f, Praha, Česká republika.  
Tel.: +420 220 382 111; e-mail: prague.info@roche.com

**Použijte odleповací část štítku, abyste se ujistil(a), že svému pacientovi podáváte správnou lékovou formu a sílu, jak je ukázáno níže**

**MabThera 1 400 mg roztok pro subkutánní injekci  
POUŽIJTE POUZE U NHL\***



1. Štítek na lahvičce přípravku MabThera 1400 mg



2. Odstraňte odleповací část



3. Nalepte odleповací část na injekční stříkačku



**MabThera 1 600 mg roztok pro subkutánní injekci  
POUŽIJTE POUZE U CLL\***



1. Štítek na lahvičce přípravku MabThera 1 600 mg



2. Odstraňte odleповací část



3. Nalepte odleповací část na injekční stříkačku

