

Příbalová informace - Rp.  
Informace pro použití, čtěte pozorně!

MINITHIXEN  
dražé

- V: Léčiva a. s., Praha, ČR.
- S: Chlorprothixeni hydrochloridum 5 mg v 1 dražé.
- IS: Neuroleptikum se sedativním účinkem.
- CH: Minithixen ovlivňuje procesy komunikace mezi buňkami v mozku a tím může příznivě působit při duševních poruchách. Má hlavně zklidňující účinek, působí proti úzkosti a depresi.
- I: Minithixen se podává hlavně při duševní podrážděnosti, úzkosti a emočním napětí, úzkostné depresi, nespavosti se ztíženým usínáním či častým probouzením. U dětí se podává při neklidu, poruchách chování s předrážděností, při břišních křečích, zvracení, jako přídatná léčba koktavosti.
- KI: Minithixen se nepodává při přecitlivělosti na účinnou látku. Při některých onemocněních je třeba zvláštní opatrnosti při podání Minithixenu, informujte proto lékaře o všech onemocněních, kterými trpíte a o lécích, které užíváte. Zvlášt' pečlivě lékař zvažuje podání u pacientů s epilepsií, parkinsonismem, poruchami srdeční činnosti, těžším onemocněním jater a ledvin, poruchami krvetvorby, astmatem, zbytněním prostaty a glaukomem (zeleným zákalem). Minithixen se obvykle nepodává v těhotenství. Informujte proto svého lékaře ihned o případném těhotenství, aby mohl rozhodnout o jeho podávání. Minithixen se nedoporučuje podávat kojícím matkám.
- NÚ: Během léčby se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako ospalost, únavnost, sucho v ústech, bušení srdce, závratě až mdloby, případně příznaky parkinsonismu jako třes rukou, ztuhlost svalstva obličejce a končetin. Vzhledem k nízké dávce účinné látky se tyto nežádoucí účinky objevují zřídka a nebývají závažné. Uvědomte lékaře o všech nežádoucích účincích, ale léčbu bez jeho doporučení nepřerušujte, poněvadž tyto účinky většinou pominou samy.
- IT: Účinky Minithixenu a jiných léků současně podávaných se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Minithixen.
- UP: Během léčby Minithixenem se nesmějí pít alkoholické nápoje, není vhodné slunění a vystavování se nadměrně vysokým či nízkým teplotám. Přípravek může zejména na počátku léčby nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tuto činnost proto můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
- D: Dávkování určuje vždy lékař. Obvykle se podává zpočátku dospělým 1-2 dražé na noc, podle potřeby se dávka na noc zvýší, případně se přidá 1 dražé ráno a v poledne. Dětem se podává obvykle 1-2 dražé denně.
- PŘ: Při předávkování vyhledejte lékaře.
- PO: Ukládejte mimo dosah dětí.
- VA: Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vnačené na obalu.
- BA: 50 dražé.