

AGOMELATIN

Název léčivého přípravku:

Doporučení k předcházení jaterních nežádoucích účinků

Agomelatin může vyvolat nežádoucí účinky včetně změn jaterních funkcí.

Tato příručka poskytuje doporučení, jak předcházet jaterním nežádoucím účinkům, a rady, co dělat, pokud se během léčby agomelatinem tyto nežádoucí účinky vyskytnou.

Pokud potřebujete jakékoli další informace, zeptejte se svého lékaře.

Léčivé přípravky obsahující agomelatin patří do skupiny antidepresiv a tento léčivý přípravek Vám byl předepsán k léčbě deprese.

Pro správný průběh zdravotní péče dodržujte doporučení svého lékaře ohledně užívání agomelatinu (dávka, délka léčby, sledování průběhu léčby zahrnující pravidelné návštěvy a krevní testy).

CO DĚLAT PŘED ZAHÁJENÍM LÉČBY AGOMELATINEM?

- Informujte svého lékaře, pokud jste si vědom(a), že Vaše játra nepracují správně: v takovém případě agomelatin neužívejte.
- Mohou existovat i jiné důvody, kvůli kterým pro Vás agomelatin nemusí být vhodný.

Prosím, poradte se s lékařem, jestliže:

- jste někdy měl(a) problémy s játry,
- jste obézní nebo máte nadváhu,
- máte cukrovku,
- pijete alkohol,
- užíváte jiné léky (některé z léků ovlivňují játra).

JAK PŘEDCHÁZET PROBLÉMŮM BĚHEM LÉČBY?

➤ Pravidelně docházejte na krevní testy

• Proč?

Lékař **před zahájením léčby** musí zkontrolovat, že Vaše játra pracují správně. Krevní testy, na které Vás lékař odeslal, mu ukážou, **jak Vaše játra pracují**, a pomohou mu rozhodnout, jestli je pro Vás agomelatin vhodný.

Během léčby agomelatinem může u některých pacientů dojít ke zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi. Hladiny těchto jaterních enzymů ukazují, jestli je funkce jater dostatečná nebo nedostatečná, a pro lékaře je jejich stanovení nezbytné ke sledování průběhu Vaší léčby.

• Kdy?

	Před zahájením léčby nebo při zvýšení dávky	Asi za 3 týdny	Asi za 6 týdnů	Asi za 3 měsíce	Asi za 6 měsíců
Krevní testy	✓	✓	✓	✓	✓

Pokud Vám lékař zvýší dávku na 50 mg, znovu je zapotřebí provést krevní testy.

Nezapomeňte k lékaři přinést **PŘIPOMÍNKOVOU KARTU PLÁNOVANÝCH KREVNÍCH TESTŮ** (na další straně)

Ihned informujte svého lékaře, pokud se dozvíte, že během léčby došlo k vzestupu hladiny jaterních enzymů ve Vaší krvi.

➤ **Dávejte pozor na projevy a příznaky jaterních problémů**

Pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků, může to znamenat, že Vaše játra nepracují správně:

- zežloutnutí kůže/očí,
- tmavé zbarvení moči,
- světlé zbarvení stolice,
- bolest v pravé horní části břicha,
- neobvyklá únava (zejména spojená s dalšími výše uvedenými příznaky).

⇒ Neprodleně se poradte s lékařem, který Vám může doporučit, abyste agomelatin přestal(a) užívat.

PŘIPOMÍNKOVÁ KARTA PLÁNOVANÝCH KREVNÍCH TESTŮ

NEZAPOMEŇTE

Je důležité, abyste během léčby agomelatinem pravidelně podstupoval(a) krevní testy.

NÁSLEDUJÍCÍ TABULKA VÁM POMŮŽE SLEDOVAT PLÁNOVANÁ DATA KREVNÍCH TESTŮ.

AGOMELATIN 25 mg – DATUM PRVNÍHO UŽITÍ:	
Intervaly krevních testů ke zjištění hladiny jaterních enzymů	Datum
Datum prvního testu <i>(před zahájením léčby)</i>	
Datum druhého testu <i>(asi za 3 týdny)</i>	
Datum třetího testu <i>(asi za 6 týdnů)</i>	
Datum čtvrtého testu <i>(asi za 3 měsíce)</i>	
Datum pátého testu <i>(asi za 6 měsíců)</i>	

Lékař může rozhodnout, že je třeba provést další krevní testy.

ZVÝŠENÍ DÁVKY NA 50 mg – DATUM PRVNÍHO UŽITÍ:	
Intervaly krevních testů ke zjištění hladiny jaterních enzymů	Datum
Datum testu při zvýšení dávky na 50 mg	
Datum druhého testu <i>(asi za 3 týdny)</i>	
Datum třetího testu <i>(asi za 6 týdnů)</i>	
Datum čtvrtého testu <i>(asi za 3 měsíce)</i>	
Datum pátého testu <i>(asi za 6 měsíců)</i>	

Lékař může rozhodnout, že je třeba provést další krevní testy.

Nezapomeňte tuto kartičku přinést na každou návštěvu u svého lékaře.

Podrobnější informace naleznete v příbalové informaci obsažené v balení přípravku.