

Kontrolní seznam 2: Kontrolní seznam pro sledování probíhající terapie metylfenidátem

Následující informace jsou určeny jako pomoc při sledování probíhající terapie pomocí léčivého přípravku obsahujícího MPH u příslušných pacientů s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou (ADHD).

Jak je podrobněji uvedeno v SmPC, měl by se pravidelně sledovat růst (týká se pouze dětí a dospívajících mladších 18 let), psychiatrický stav a kardiovaskulární stav:

- **Krevní tlak a puls** by měly být zaznamenány **při každé úpravě dávky**, a poté **alespoň každých 6 měsíců**
- **Výška, tělesná hmotnost a chuť k jídlu** by měly být zaznamenány **alespoň každých 6 měsíců**, přičemž je třeba vést růstový graf (týká se pouze dětí a dospívajících mladších 18 let)
- **Rozvoj nových nebo zhoršení předcházejících psychiatrických poruch**, včetně netypických psychiatrických příznaků, jako jsou vokální nebo motorické tiky, by se mělo monitorovat **při každé úpravě dávky**, a poté **alespoň každých 6 měsíců** a při každé návštěvě

Doporučuje se, aby byl tento kontrolní seznam používán ve spojení s SmPC.

Před konzultací si stáhněte a vytiskněte tento kontrolní seznam. Nebudete moci ukládat žádné specifické informace o pacientech na internetové stránky. Vyplněný kontrolní seznam může být uložen do záznamů pacienta.

Při postupném procházení tohoto kontrolního seznamu může být pro vás užitečné prodiskutovat příbalovou informaci (PIL) konkrétního předepisovaného léčivého přípravku s vaším pacientem nebo opatrovníky a u dětí a dospívajících mladších 18 let jeho rodiči nebo opatrovníky.

Sledování během probíhající léčby za použití MPH

Datum posouzení:	
Důvod posouzení:	
Jméno pacienta:	
Datum narození:	
Věk:	Pohlaví:

Pečlivě zkontrolujte následující systémy, jak je uvedeno níže, při každé úpravě dávky a při návazných návštěvách alespoň každých 6 měsíců:

		Vyhodnocení
Obecné zdravotní nálezy, u dětí a dospívajících mladších 18 let	Údaje doplňte do přehledu pro průběžné sledování léčby metylfenidátem	
• Zdokumentujte výšku, tělesnou hmotnost a chuť k jídlu, přičemž u pediatrických pacientů je třeba vést růstový graf- týká se pouze dětí a dospívajících mladších 18 let		☐
Zvažte ukončení podávání MPH, je-li růst nižší než očekávání		
Obecné zdravotní nálezy, všichni pacienti		
• Zdokumentujte jakýkoliv náznak zneužívání, nesprávného užívání nebo odchýlení od doporučeného režimu užívání		☐
• Těhotenství		☐
Vyhodnocení přínosů / rizik		
Nové kardiovaskulární nálezy, všichni pacienti	Měl by být zaznamenán krevní tlak a puls	
• Palpitace		☐
• Bolest na hrudi při námaze		☐
• Nevysvětlená synkopa		☐
• Dyspnoe		☐
• Další příznaky indikující srdeční onemocnění		☐
Odešlete na okamžité kardiologické vyšetření		
Nové neurologické nálezy, všichni pacienti		
• Silné bolesti hlavy, pocit necitlivosti, slabost či paralýza, porucha koordinace, zraku, řeči, jazyka či paměti		☐
Jakékoliv z výše uvedených stavů mohou indikovat cerebrální vaskulitidu: přestaňte podávat MPH		
• Zvýšení frekvence záchvatů nebo nový nástup záchvatů		☐
Je nutno ukončit podávání MPH		

		Vyhodnocení
Nové psychiatrické nálezy nebo jejich zhoršení, všichni pacienti		Měl by být sledován vývoj nových nebo zhoršení předcházejících psychiatrických poruch
• Psychotické nebo manické příznaky		☐
Zvažte ukončení podávání MPH		
• Sebevražedné myšlenky nebo chování		☐
Zvažte léčbu základního psychiatrického onemocnění		
Přehodnoťte přínosy a rizika podávání MPH		
Zvažte ukončení podávání MPH		
• Agresivní nebo nepřátelské chování		☐
Zvažte potřebu úpravy léčby		
• Úzkost, agitovanost nebo napětí		☐
• Depresivní příznaky		☐
• Pohybové nebo verbální tiky nebo jejich zhoršení		☐
Doba trvání léčby, všichni pacienti		
• Pacient je léčen kontinuálně po dobu delší než 12 měsíců		☐
• Je upozorováno zlepšení příznaků po odpovídající úpravě dávkování v průběhu 1 měsíce, jinak se doporučuje ukončení podávání léku		☐
Zvažte zkušební období bez podávání léků alespoň jednou za rok, abyste mohli stanovit, zda je ještě nutno pokračovat v léčbě		

V návaznosti na výše provedené vyhodnocení použijte připojený přehled pro zaznamenání informací požadovaných pro průběžné sledování: [\(odkaz na přehled\)](#)

Ukončení léčby

Během doby vysazení léku se požaduje pečlivý lékařský dohled, neboť tento krok může vést k odhalení:

- Depresí
- Chronické nadměrné aktivity

Někteří pacienti mohou vyžadovat dlouhodobou návaznou péči.

Zde zaznamenejte všechny doplňující informace