

Thiazid, thiazidová diuretika a kombinace – choroidální efuze (EPITT č. 19468)

Souhrn údajů o přípravku

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Choroidální efuze, akutní myopie a sekundární glaukom s uzavřeným úhlem

Sulfonamidy nebo deriváty sulfonamidů mohou způsobit idiosynkratickou reakci vedoucí k choroidální efuzi s defektem zorného pole, přechodné myopii a akutnímu glaukomu s uzavřeným úhlem. Příznaky zahrnují náhlý pokles zrakové ostrosti nebo bolesti očí a obvykle se objevují během hodin až týdnů po zahájení léčby. Neléčený akutní glaukom s uzavřeným úhlem může vést k trvalé ztrátě zraku. Primární léčba spočívá v co nejrychlejším vysazení léčiva. Pokud se nitrooční tlak nepodaří dostat pod kontrolu, je třeba zvážit rychlou medikamentózní nebo chirurgickou léčbu. Rizikové faktory pro rozvoj akutního glaukomu s uzavřeným úhlem mohou zahrnovat alergie na sulfonamidy nebo peniciliny v anamnéze.

4.8. Nežádoucí účinky

U přípravků obsahujících hydrochlorothiazid, chlortalidon a indapamid:

Poruchy oka: choroidální efuze (frekvence „není známo“)

U přípravků obsahujících bendroflumethiazid, cikletanin, klopamid, cyklopenthiazid, hydroflumethiazid, metipamid, metolazon, xipamid (choroidální efuze nebyla dosud hlášena, ale je považována za účinek této třídy léčivých přípravků):

c. Popis vybraných nežádoucích účinků:

Po používání thiazidu nebo thiazidových diuretik byly hlášeny případy choroidální efuze s defektem zorného pole.

Pokud budou v budoucnu hlášeny případy pro tyto látky, je zapotřebí použít odpovídající postup k aktualizaci informací o přípravku.

Příbalová informace

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek [název přípravku] používat

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku [název přípravku] se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud se u Vás objevilo snížení vidění nebo bolest oka. Může se jednat o příznaky prosáknutí cévnatky nebo o zvýšený tlak v oku a může k němu dojít během hodin až týdnů po použití přípravku [název přípravku]. Bez léčby může dojít k trvalé ztrátě zraku. Jestliže jste v minulosti měl(a) alergii na penicilin nebo sulfonamidy, můžete být ve zvýšeném riziku.

4. Možné nežádoucí účinky

Snížení vidění nebo bolest očí z důvodu vysokého tlaku (možné příznaky prosáknutí cévnatky (choroidální efuze) nebo akutního glaukomu s uzavřeným úhlem (zelený zákal).
