

**Změny, které mají být provedeny v příslušných bodech informací o přípravku** (nový text **podtržený a tučně**, vymazaný text ~~přeškrtnutý~~)

### Souhrn údajů o přípravku

Varování by mělo být přidáno následujícím způsobem:

- Bod 4.4

#### **Perorální antiagregační léčba inhibítorem P2Y12**

**Během prvního dne souběžné léčby inhibítorem P2Y12 a morfinem byla pozorována snížená účinnost léčby inhibítorem P2Y12 (viz bod 4.5).**

Interakce musí být přidány následujícím způsobem:

- Bod 4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

**U pacientů s akutním koronárním syndromem léčených morfinem byla pozorována zpožděná a snížená expozice perorální antiagregační léčby inhibítorem P2Y12. Tato interakce může souviset se sníženou gastrointestinální motilitou a může se vztahovat i na jiné opioidy. Klinický význam není znám, ale data naznačují potenciál snížené účinnosti inhibítoru P2Y12 u pacientů, kterým je současně podáván morfin a inhibitor P2Y12 (viz bod 4.4). U pacientů s akutním koronárním syndromem, u nichž nelze morfin vysadit a rychlá inhibice P2Y12 je považována za klíčovou, lze zvážit použití parenterálního inhibítoru P2Y12.**

### Příbalová informace

- Bod 2

Ostatní léčivé přípravky a <název léčivého přípravku>

- **Některé léky používané k léčbě krevních sraženin (např. klopidogrel, prasugrel, tikagrelor) mohou mít v případě společného užívání s morfinem opožděný a snížený účinek.**