

XYREM (natrii oxybas)

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PRO PACIENTY

DODRŽUJTE PROSÍM TYTO POKYNY

- Mějte kartu pacienta stále u sebe
- Ukažte tuto kartu každému lékaři, který Vás léčí nebo lékárníkovi
- Mějte u sebe seznam všech léků, které užíváte, když jdete k lékaři nebo do lékárny
- Pokud se u Vás vyskytne při užívání Xyremu jakýkoli neobvyklý příznak, jako jsou zvláštní myšlenky, včetně myšlenek na páčání násilí či myšlenek na poškozování ostatních), informujte neprodleně svého lékaře
- Uchovávejte Xyrem mimo dohled a dosah dětí

Datum prvního předepsání přípravku Xyrem: _____

INFORMACE O KONTAKTECH

Jméno pacienta: _____

Telefonní číslo pacienta: _____

Jméno ošetřující osoby: _____

Telefonní číslo ošetřující osoby: _____

Jméno ošetřujícího lékaře: _____

Telefonní číslo ošetřujícího lékaře: _____

Telefonní číslo na zdravotnickou záchrannou službu: _____

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PRO PACIENTY

XYREM může vyvolat útlum dýchání a poruchu vědomí.

DODRŽUJTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ:

- **NEPOŽÍVEJTE** alkohol při léčbě Xyremem
- **NEUŽÍVEJTE** větší dávku Xyremu, než Vám předepsal lékař
- **NEŘÍDTE** a neobsluhujte stroje po dobu nejméně 6 hodin po užití Xyremu (dospělí)
- **NEVYKONÁVEJTE** činnost vyžadující plnou bdělost nejméně 6 hodin po užití Xyremu (děti)
- **NEUŽÍVEJTE** jiné léky bez rady se svým lékařem
- **NEDÁVEJTE** Xyrem žádné další osobě.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PRO LÉKAŘE/FARMACEUTY

Tento pacient užívá Xyrem pro léčbu narkolepsie s kataplexií.

Xyrem může vyvolat útlum dýchání a útlum CNS, záchvaty, psychotické poruchy, deprese a myšlenky na sebevraždu.

Opioidy nebo barbituráty ani další léky způsobující útlum dýchání nebo CNS nesmí být užívány současně s Xyremem. Zvláštní opatrnosti je třeba při současném užívání Xyremu s topiramátem a valproátem.

Xyrem má potenciál pro zneužívání.

Před předepsáním/vydáním dalších léků tomuto pacientovi si, prosím, prostudujte SPC pro Xyrem.